

この説明書は、服用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

胃のもたれ、胸やけ、飲みすぎに 【健胃薬】 第2類医薬品



現代は飽食の時代ともいわれ、食べすぎたり、飲みすぎたりしてしまう機会が多くなります。また疲労やストレスなどが誘因となって、胃腸の病気がおこることが知られています。

ピーマTP健胃薬は胃の粘液量を増大させ胃粘膜を守るテブレノンの他、胃の働きを高め、胃もたれなどの自覚症状を緩和するソウジュツ乾燥エキス-S、コウボク乾燥エキス、胃粘膜を修復し、胃の痛みなどを緩和するカンソウエキスなど3種類の生薬エキスを配合した弱った胃の働きをよくする健胃薬です。

胃のもたれ・胸やけ・飲みすぎなどの症状がある時に服用をお勧めします。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 肝臓病の人。
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹、発赤、かゆみ
消 化 器	腹部膨満感、はきけ、腹痛
精神神経系	頭痛
そ の 他	皮下出血

- (2) 2週間位服用しても症状がよくなる場合

3. まれに全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）などがあらわれます。このような症状がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

便秘、下痢、口のかわき

効能・効果

胃もたれ、食べすぎ、飲みすぎ、胸やけ、食欲不振、胃部・腹部膨満感、はきけ（むかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、胸つかえ

用法・用量

次の量を食後に水またはお湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	1包	3回
小児（15才未満）	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

用法・用量を守ってください。

成分

成人1日量3包（4.5g）中に次の成分を含んでいます。

成 分	含 量	働 き
テブレノン	112.5mg	胃の粘液量を増大させ、胃粘膜を守ります。
ソウジュツ乾燥エキス-S （原生薬としてソウジュツ）	150mg （1.5g）	胃の働きを高め、胃もたれなどの自覚症状を緩和します。
コウボク乾燥エキス （原生薬としてコウボク）	83.4mg （1.0g）	
カンゾウエキス （原生薬としてカンゾウ）	200mg （0.6g）	胃粘膜を修復し、胃の痛みなどを緩和します。

添加物として 無水ケイ酸、乳糖、D-マンニトール、CMC-Ca、L-メントール、ケイヒ末、トコフェロール酢酸エステル、香料、エタノール、トウモロコシデンプンを含んでいます。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (2) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。
- (5) 本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。



副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お問い合わせ先

本剤の服用により、何か変わった症状があらわれるなど、お気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

三宝製薬株式会社 お客様相談室 電話03-3952-0100
月～金曜日 9：00～17：00（祝祭日を除く）



製造販売元
三宝製薬株式会社
東京都新宿区下落合2-3-18