

食べすぎ・飲みすぎ・胃のもたれに
2種類の消化酵素・5種類の健胃生薬
を配合した複合胃腸薬

新キーパーU[®]顆粒

第2類医薬品

特 徴

私たちの生活の中でありがちな、つい調子によって食べすぎたときの胃のもたれ、飲みすぎたときのむかつき、胃酸過多による胸やけや胃痛は、なんとかスッキリさせたい症状です。

新キーパーU[®]顆粒は、2種類の消化酵素に5種類の健胃生薬と、制酸剤・胃粘膜修復剤・消泡剤をそれぞれバランスよく配合した白と緑の爽やかな服用感のある顆粒剤です。現代人の食生活や、ストレスの多いライフスタイルにマッチした、優れた効きめの胃腸薬です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の方は服用しないでください
透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)
4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の方は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人。
腎臓病、心臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき、便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効能・効果

- 食べ過ぎ、胸やけ、消化不良、消化促進、胃部・腹部膨満感、げっぷ
- 飲み過ぎ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐
- 胃もたれ、食欲不振、胃重、胃部不快感、胸つかえ、胃弱、胃酸過多、胃痛

用法・用量

次の1回量を1日3回、食後に服用してください。

年齢	15才以上	11才以上 ～15才未満	8才以上 ～11才未満	5才以上 ～8才未満	3才以上 ～5才未満	3才未満
1回量	1包	2／3包	1／2包	1／3包	1／4包	服用させないでください

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

3包(4.2g)中に次の成分を含んでいます。

成分・分量	分量	作用
ピオチアスターゼ	450mg	炭水化物だけでなく、タンパク質や繊維にも働く複合消化酵素で、消化を促し、胃をスッキリさせます。
リパーゼAP6	60mg	もたれやすい脂肪の分解を促進して、食べ過ぎ・消化不良、胃もたれなどに効果をあらわします。
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	1,500mg	過剰な胃酸を持続的に中和し、胃の酸度を適切に保つことにより、げっぷ・胸やけなど胃酸過多による不快な症状を抑えます。また胃の荒れた粘膜を保護する作用もあります。
炭酸水素ナトリウム	720mg	過剰な胃酸を速効的に中和する成分です。
ロートエキス	30mg	胃腸の動きをコントロールする神経に作用して、胃酸の分泌を抑え、胃の痛みをしずめます。
銅クロロフィリンナトリウム 赤芽柏(アカメガシワ)末 カンゾウエキス末 (カンゾウとして525mg)	45mg 300mg 75mg	銅クロロフィリンナトリウム(クロロフィルを安定化したもの)、赤芽柏末・カンゾウエキス末は、胃の粘膜組織を修復、保護します。
コロンボ末 ゲンチアナ末 ハッカ油 ウイキョウ油 チョウジ油	150mg 50mg 30mg 12mg 12mg	芳香性・苦味性健胃生薬が口の粘膜や胃壁を刺激して、消化液の分泌を促し、食欲の増進をはかり、弱った胃の動きを回復します。
ジメチルポリシロキサン	180mg	微量で消泡作用を示し、胃に滞留した気泡やガスを取り除いて、不快なげっぷや胃の膨満感を除去します。

○添加物として乳糖水和物、精製白糖、ポビドン、ヒドロキシプロピルセルロースを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (4) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5) 外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、または下記にお願い申し上げます。
カイゲンファーマ株式会社 お客様相談室 電話 06-6202-8911
受付時間：9:00～17:00(土曜、日曜、祝日を除く)