



【第2類医薬品】リポビタミンゴールドエース

服用に際しては、説明書をよく読んでください。

【使用上の注意】**【相談すること】**1.次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1)服用後、次の症状があらわれた場合。皮膚：発疹・消化器：胃部不快感 (2)しばらく服用しても症状がよくなる場合。
2.次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。 下痢

【成分】1本(50mL)中 タウリン 1500mg、ローヤルゼリー 200mg、ニンジンエキス(β 90mg(人参30mgに相当))、オウゴンエキス(β 0.2mL(黄芩 200mgに相当))、ハグキゲン流エキス 0.2mL(巴戟天 200mgに相当)、チアミン塩化物(ビタミンB1) 5mg、リポフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2) 5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6) 5mg、トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE) 30mg、ニコチン酸アミド 20mg、イノシトール 100mg、無水カフェイン 50mg
添加物：白糖、D-ソルビトール、スクラロース、アセスルファムK、ポビドン、グリセリン、脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン脂肪酸化ヒマシ油、グリセリン、安息香酸Na、クエン酸、クエン酸Na、香料、アルコール、パリエリン(アルコール0.2mL以下)

【注 意】本剤の服用により、尿が黄色になることがあります。これは本剤中のビタミンB2によるもので、心配ありません。
【効 能】☆滋養強壮 ☆虚器体質 ☆肉体的疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠産後などの適色の栄養補給 【用法・用量】成人(15才以上)1日1回1本(50mL)を服用してください。 ※15才未満は服用しないでください。【注 意】(1)定められた用法・用量を厳守してください。(2)本剤は生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。【保管及び有效期間上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手のとどかない所に保管してください。(3)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

大正製薬(株)お客様119番室 電話03-3985-1800

製造番号

使用期限
(西暦年月)

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

ガラス：瓶 金属：キャップ

★キャップと瓶は分別して捨ててください

第2類医薬品



50mL



大正製薬

株式会社¹¹

東京都豊島区高田3丁目24番1号