

本品には添付文書はついていません。ラベルの表示が代用しています。

販売名：ソルマック EX2
使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
●長期連用しないで下さい。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。(1)医師の治療を受けている人(2)高齢者(3)むくみのある人(4)高血圧、腎臓病、心臓病の診断を受けた人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。(1)まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。症状名：偽アルドステロン症、症状：尿量が減少する、顔色が悪くなる、手足がむくむ、まぶたが重くなる、頭痛、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。(2)5～6日間服用しても症状がよくならない場合。

第2類医薬品

用法・用量 成人(15歳以上)1日1回1本(50mL)を服用して下さい。

●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。

●用法・用量を厳守して下さい。

成分 1本(50mL)中()内は
原生薬換算値

エンメイソウエキス30mg(201mg)
ウコン流エキス0.3mL(300mg)
カンゾウ抽出物115mg(1644.5mg)
チョウジチンキ0.126mL(37.8mg)
ゲンチアナチンキ0.376mL(112.8mg)
ニンジン流エキス0.5mL(500mg)
オウレンチンキ0.792mL(237.6mg)
ソウジュツ流エキス1.2mL(1200mg)
ケイヒチンキ0.25mL(75mg)
カルニチン塩化物 120mg

添加物：白糖、ハチミツ、アルコール、プロピレングリコール、アラビアゴム、エデト酸Ca/2Na、L-メントール、安息香酸Na、pH調整剤、香料

(アルコール 1.5 mL以下)

●生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあるのでよく振ってから服用して下さい。

副作用救済制度
TEL 0120-149-931

生薬配合 第2類医薬品
胃腸薬

ソルマック

EX2[®]
ウコン・ニンジン配合!

販売名：ソルマックEX2
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL 03(3293)4509
<http://www.taiho.co.jp/>

TAIHO

効能・効果 食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、もたれ(胃もたれ)、はきけ(二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、胃弱、食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胸やけ、胸つかえ

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。(5)開栓されている製品は服用しないで下さい。開栓後は保存しないで下さい。

使用
期限

50mL

ガラス：瓶
金属：キャップ

製造
番号



®：登録商標 L0901