使用上の注意

【してはいけないこと】

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

●長期連用しないで下さい。

【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1)医師の治療を受けている人(2)高齢者(3)むくみのある人(4)高血圧、腎臓病、心臓病の診断を受けた人
2. 服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師の診療を受けて下さい。
偽アルドステロン症、ミオパチー（手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。）
3. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

用法・用量 成人(15歳以上)1日1回1本(50mL)を服用して下さい。
●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。
●用法・用量を厳守して下さい。

成分 ー1本(50mL)中ー（　）内は原生薬換算値

エンメイソウエキス30mg(201mg)
ウコン流エキス0.3mL(300mg)
カンゾウ抽出物115mg(1644.5mg)
チョウジチンキ0.126mL(37.8mg)
ゲンチアナチンキ0.376mL(112.8mg)
ニンジン流エキス0.5mL(500mg)
オウレンチンキ0.792mL(237.6mg)
ソウジュツ流エキス1.2mL(1200mg)
ケイヒチンキ0.25mL(75mg)
カルニチン塩化物120mg

添加物：白糖、ハチミツ、アルコール、プロピレングリコール、アラビアゴム、エデト酸Ca／2Na、l-メントール、安息香酸Na、pH調整剤、香料
（アルコール 1.5 mL以下）

●生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあるので、よく振ってから服用して下さい。

副作用救済制度
TEL 0120-149-931

生薬配合
胃腸薬

第2類医薬品

ソルマック® EX2

ウコン・ニンジン配合!

販売名：ソルマックEX2

製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/

効能・効果 食べ過ぎ（過食）、飲み過ぎ（過飲）、もたれ（胃もたれ）、はきけ（二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、胃弱、食欲不振（食欲減退）、胃部・腹部膨満感、消化不良、胸やけ、胸つかえ

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わります）。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

Ⓡ:登録商標

使用期限

50mL　L1903　製造番号

ガラス:瓶
金属:キャップ

4514639