

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

漢方薬

第2類医薬品

小柴胡湯Aエキス細粒「分包」三和生薬

ショウサイコトウ

製品の特徴

小柴胡湯は、漢方の原典と言われる「傷寒論」^{しょうかんろん}「金匱要略」^{きんぎやうりやく}に記載されている漢方処方
で、体力が中等度で、ときに脇腹(腹)からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振
や口の苦味があり、舌に白苔がつく場合の、食欲不振、はきけ、胃炎、胃痛、胃腸虚
弱、疲労感、かぜの後期の諸症状に用いられます。

小柴胡湯Aエキス細粒「分包」三和生薬は、小柴胡湯をエキス化し、服用しやすい細粒に
した製品です。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。むくみ
 - 次の診断を受けた人。肝臓病、高血圧、心臓病、腎臓病
 - インターフェロン製剤で治療を受けている人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服
用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してくだ
さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察
を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息 苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわ れたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱 力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色 尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位(かぜの後期の諸症状)に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよ
くならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販
売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

体力中等度で、ときに脇腹(腹)からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振や口の苦味があり、舌に白苔がつくもの次の諸症：

食欲不振、はきけ、胃炎、胃痛、胃腸虚弱、疲労感、かぜの後期の諸症状

用法・用量

1回下記量を食前又は食間に水又はお湯と一緒に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1包	3回
7才以上15才未満	2/3包	
4才以上7才未満	1/2包	
4才未満	服用させないでください	

食間とは、「食事と食事の間」という意味です。食事のあと2時間ぐらいたったところで服用してください。

<用法・用量に関する注意>

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量(3包(6.0g)中)

小柴胡湯エキス(4/5量)……3.7g

サイコ……………4.8g	ハンゲ……………4.0g	オウゴン……………2.4g
タイソウ……………2.4g	ニンジン……………2.4g	カンゾウ……………1.6g
ショウキョウ……0.8g		

添加物として、乳糖、セルロース、部分アルファー化デンプン、ステアリン酸Ca、無水ケイ酸を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6) 本剤は、生薬を用いた製剤ですので、製品により色が多少異なることがありますが、効果に変わりはありません。

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 お客様相談室

☎ 0570-666-170

受付時間 9時～12時、13時～17時(土、日、祝日を除く)

販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲1624

<https://www.wakunaga.co.jp/>

製造販売元

三和生薬株式会社

栃木県宇都宮市平出工業団地6-1