

だい おう かん ぞう とう
大黄甘草湯 A エキス細粒 三和生薬

大黄甘草湯 A エキス細粒 三和生薬は、漢方処方「大黄甘草湯」の水製エキスを服用しやすい細粒にしたもので



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

- 次的人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊娠又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
- 5~6日間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

適応症

便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの（にきび）・食欲不振（食欲減退）・腹部膨満・腸内異常醸酵・痔などの症状の緩和

（適応症に関連する注意）

体力に関わらず、使用できる。

用法・用量

次の1回量を1日1回就寝前（又は空腹時）に服用。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合をみながら、少しづつ增量（下記の最大量まで）又は減量。

年令	1回量
大人（15才以上）	0.8g~1.6g
11才~14才	0.5g~1.0g
7才~10才	0.4g~0.8g
7才未満	服用しないこと

（用法・用量に関連する注意）

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成 分

本品1日量	1.6g 中
大黄甘草湯エキス（1/2量）	0.8g
ダイオウ	2.0g
カンゾウ	0.5g
*上記の生薬より抽出したエキス	

添加物として乳糖、セルロース、部分アルファー化デンプン、ステアリン酸Ca、無水ケイ酸を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

*消費者くすり相談室 TEL 0570-095770

10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。



三和生薬株式会社
栃木県宇都宮市平出工業団地6-1