

りっくん し とう
六君子湯 A エキス錠 三和生薬

六君子湯Aエキス錠 三和生薬は、漢方処方「六君子湯」の水製エキスを服用しやすい錠剤にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
肝 機 能 障 害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

成 分

本品1日量18錠（1錠0.35g）中

六君子湯A水製エキス 2.9 g

ニンジン 2.4 g	チ ン ピ 1.2 g
ビャクジュツ ... 2.4 g	ショウキョウ ... 0.3 g
ブクリョウ 2.4 g	タイソウ 1.2 g
ハ ン ゲ 2.4 g	カンゾウ 0.6 g

添加物として乳糖、セルロース、アルファー化デンプン、カルメロース Ca、カルメロース、ステアリン酸 Ca、無水ケイ酸、メタケイ酸アルミン酸 Mg を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

三和生薬株式会社

TEL 03-3834-2171（代）

適応症

体力中等度以下で、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症：

胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	6錠
7才～14才	4錠
5才～6才	3錠
5才未満	服用しないこと

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。



三 和 生 薬 株 式 会 社

宇都宮市平出工業団地6-1

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果には変わりございません。