

服用に際してピンの表示を必ず読むこと。

【使用上の注意】 相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること(1)服用後、次の症状があらわれた場合 皮膚:発疹 / 消化器:胃部不快感(2)しばらく服用しても症状がよくなる場合 2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること 下痢

【用法・用量】

成人(15才以上)1日1回1瓶(50mL)を服用してください。

●用法・用量を守ってください。
(他のビタミン等を含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意してください)

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

1

滋養強壮・肉体疲労時の栄養補給に

5種のアミノ酸

+

ピリドキシン塩酸塩10mg 配合



50mL

クレビタンV内服液

小林薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市中橋1丁目139番地

指定医薬部外品

【効 能】

○滋養強壮 ○虚弱体質

○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【成分・分量】 50mL中

L-バリン10mg、L-ロイシン10mg、L-トレオニン10mg、L-イソロイシン10mg、L-フェニルアラニン10mg、タウリン750mg、チアミン硝酸塩10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム4mg、ピリドキシン塩酸塩10mg、ニコチン酸アミド20mg、無水カフェイン50mg(アルコール0.2mL以下) 添加物:白糖、D-ソルビトール、クエン酸水和物、アルコール、安息香酸Na、パラベン、メタリン酸Na、香料、ミツロウ、エチルパニリン、グリセリン、プロピレングリコール、パニリン
280円+税

ガラス:瓶、金属:キャップ

お客様相談室 電話:0120-584-419

使用期限

製造番号

