

2008年 8 月改訂

かぜのいろいろな症状に…
和漢薬ゴオウ(牛黄)・ニンジン配合

第②類医薬品

B

かぜマエック®N

本剤の特徴

- 7種類の有効成分がはたらいて、かぜの11種類の症状を緩和する総合かぜ薬です。
- 和漢薬ゴオウ(牛黄)は、熱をさげる薬として古くから用いられ、悪寒、発熱などに効果をあらわします。
- 薬用のニンジンは、かぜにより消耗した体力を助けます。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の方は服用しないでください。
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気があらわれることがあります。)
4. 服用時は飲酒しないでください。
5. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の方は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 授乳中の人
(4) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)
(5) 高齢者
(6) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(7) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(8) 次の症状のある人
高熱、排尿困難
(9) 次の診断を受けた人
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書をもって医師又は薬剤師に相談してください。
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること)
ぜ ん そ く	

(2) 5～6回服用しても症状の改善がみられない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

口のかわき

効能又は効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法及び用量

次の1回量を1日3回食後なるべく30分以内に、水又は白湯でかまずに服用してください。

年 齢	1 回 量	服用回数
成人（15歳以上）	2 カプセル	1 日 3 回
7 歳以上15歳未満	1 カプセル	
7 歳未満	服用しないでください	

<用法及び用量に関連する注意>

(1) 定められた用法・用量をお守りください。

(2) 7歳以上15歳未満に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(3) カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。（誤ってそのまま飲込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



成分及び分量

成 分	分量 (6 カプセル中)	は た ら き
アセトアミノフェン	600mg	熱をさげ、のどの痛みや頭痛、関節や筋肉の痛みをおさえます。
エテンザミド	500mg	
ゴオウ（牛黄）	3mg	
ニンジン乾燥エキス	54mg 〔原生薬換算量〕 804mg	
クロルフェニラミン マレイン酸塩	7.5mg	鼻水、くしゃみ、鼻づまりなどのかぜによるアレルギー症状を抑えます。
dl-メチルエフェドリン 塩酸塩	60mg	気管支をひろげてせきをしずめ、呼吸を楽にします。
無水カフェイン	75mg	ねむけを防ぎ、疲労感を取り除くとともに、頭痛をやわらげます。

添加物として、パレイショデンプン、乳糖、カルメロースCa、カルメロースNa、ラウリル硫酸Na、ゼラチンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2) お子さまの手のとどかない所に保管してください。

(3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。

(4) 表示の使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。

製品についてのお問い合わせ

・お買い求めの販売店

・ジャパンメディック株式会社 お客様相談窓口：076-438-1107
〔受付時間：月～金（祝祭日・年末年始を除く）9：00～17：00〕

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

製造販売元

ジャパンメディック株式会社
富山県富山市横越168