

虫さされ・かゆみに

第2類医薬品

ウインブルダンPCローション

鎮痒消炎剤

【特 長】

- ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル（PVA）は、「アンテドラッグ」のステロイド剤で、湿疹や皮膚炎等の炎症を鎮めます。

「アンテドラッグ」とは？……皮膚表面の患部ですぐれた抗炎症作用を発揮したのち、体内に吸収されると低活性となる性質を持つ薬剤の総称です。
そのためステロイド特有の副作用を起こしにくい特性をもっています。

- 抗ヒスタミン剤であるジフェンヒドラミン塩酸塩と鎮痒剤クロタミトンが虫さされや湿疹等に伴うかゆみを抑えます。
- l*-メントールと*dl*-カンフルのスーツとする清涼感がかゆみをすばやく鎮めます。
- 殺菌剤イソプロピルメチルフェノールが患部の感染を防ぎます。

⚠

使用上の注意

❌

してはいけないこと

＜守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります＞

1. 次の部位には使用しないでください。
(1) 水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部
(2) 目の周囲、粘膜（例えば、口唇等）
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(4) 患部が広範囲の人
(5) 湿潤やただれのひどい人
(6) 妊婦又は妊娠していると思われる人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮 膚 (患 部)	みずむし・たむし等の白癬症、 ^{はくせん} にきび、化膿症状、持続的な刺 激感

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

裏面も必ずお読みください

〔効能・効果〕

虫さされ、かゆみ、皮膚炎、かぶれ、湿疹、あせも、じんましん




〔用法・用量〕

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 定められた用法・用量をお守りください。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
3. 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診察を受けてください。
4. 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。



〔成分・分量〕

成 分	含 量 (100ml中)	は た ら き
プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル (PVA)	0.15g	湿疹・皮膚炎等のはれ・赤みを抑えます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0g	抗ヒスタミン作用により、虫さされ等に伴うかゆみや炎症を抑えます。
クロタミトン	5.0g	湿疹、虫さされ等に伴うかゆみを抑えます。
dl-カンフル	1.0g	清涼感を与え、かゆみをすばやく鎮めます。
l-メントール	3.5g	清涼感を与え、かゆみをすばやく鎮めます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	患部の感染を防ぎ、症状の悪化を防ぎます。

添加物として1,3-ブチレングリコール、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、エタノールを含有します。

〔保管及び取扱い上の注意〕

1. 直射日光の当たらない、涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
4. 火気に近づけないでください。
5. 時計、めがね等の金属類、プラスチック類、化学繊維類、皮革製品、塗装のしてある床・家具類に付着すると変質することがありますので、付着しないよう注意してください。
6. 衣類に付着した場合は、なるべく早く水又は洗剤で洗ってください。
7. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製品についてのお問い合わせ

●お買い求めの販売店

●ジャパンメディック株式会社 お客様相談窓口：076-438-1107
〔受付時間：月～金（祝祭日・年末年始を除く）9：00～17：00〕

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

製造販売元
ジャパンメディック株式会社
富山県富山市横越168