

**大容量
100mL**

微香性
液体タイプ

肩こり・腰痛 筋肉痛に

サリチル酸グリコール配合

特徴

微香性

今まで人前でニオイが気になっていた人や、ニオイに敏感な人でも安心して使用していただけです。

塗布しやすい横型ボトル

首の部分が曲がっていて、ラバーがピッタリと接しますので、背中や腰などの塗りにくい患部にもスムーズにむらなく適量を塗布できます。

つらい肩こり・腰痛に

ノナン酸バニリルアミド、サリチル酸グリコール及びl-メントール等の配合により、つらい肩こり、腰痛、筋肉痛の原因となる炎症や痛みをやわらげます。

ご使用に際して、この箱の説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう
大切に保管してください。

容量/100ml 鎮痛消炎薬

4 956622 106551

成分・分量(100g中)

サリチル酸グリコール……………3.0g
l-メントール……………3.0g
グロルフェニラミンマレイン酸塩…0.1g
グリチルレチシノ酸……………0.05g
ノナン酸バニリルアミド……………0.015g
ニコチン酸ベンジルレステアレート…0.02g
添加物として、ヒドロロース、プロピレングリコール、
アジノ・酸ジソブロード、エタノールを含有します。

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

(用法・用量)に関する注意

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に使用される場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合は、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合は眼科専門の診療を受けてください。
- 本剤のついた手で、目など粘膜にふれないでください。
- 外用にのみ用意してください。
- 入浴前の使用は控えてください。
- 入浴台で肌をこすり、汗をかいた時は、本剤による刺激が強く感じる場合があります。激しい痛み又は刺激感やかゆみを感じた場合には使用を中止し、こすらないでやさしくなるように患部をよく泡立てた石けんと水で数回洗った後、患部を冷水や軽くこすった後、オーラルなどで十分に冷やしてください。症状の改善がみられない場合は、この箱を持って医師に相談してください。
- 塗布した患部をコツツや電気毛布で温めないでください。
- 皮膚の弱い人は、同じところに続けて塗布しないでください。
- 本剤を塗った後の患部を通気性の悪いものでおおわないでください。
- スponジ面をゆっくり患部に数回押しだして、スponジに薬液を十分しみ込ませてから患部に塗布してください。薬液をスponジ面にしみませないで使用すると、スponジが破損する場合があります。

スponジ面をゆっくり患部に数回押しだして、スponジに薬液を十分しみ込ませてから患部に塗布してください。

容量/100ml 鎮痛消炎薬

4 956622 106551

**大容量
100mL**

微香性
液体タイプ

肩こり・腰痛 筋肉痛に

サリチル酸グリコール配合

△ 使用上の注意

【向いてはいけないこと

(やらないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こります)

- 1.次の部位には使用しないでください。
(1)目の周囲、粘膜等
(2)湿疹、かぶれ、傷口
- 【相談すること**
- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 2.使用後、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹、発赤、かゆみ、はれ、痛み

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持ちて医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

製造販売元
ジャパン メディック 株式会社
富山県富山市横越168

お客様相談窓口 ☎ 076-438-1107
受付時間：月～金(祝日・年末年始を除く)9:00～17:00

副作用・被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品・医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/camp/index.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

コンプラス液
第3類医薬品

セラムデイケーション
税控除対象

サリチル酸グリコール配合
コンプラス液
第3類医薬品