

かゆみ・虫さされに
ハイカユミーNIジェル
鎮痒消炎薬

〔ハイカユミーNIジェルの特長〕

- ゲルタイプで、スーッとこちよい清涼感を与えます。
- かゆみや炎症を抑える成分として、デキサメタゾン酢酸エステル、グリチルレチン酸を配合しています。
- かゆみを抑える成分として、*l*-メントール、*dl*-カンフルを配合しています。
- 殺菌作用のある成分として、イソプロピルメチルフェノールを配合しています。



使用上の注意



してはいけないこと

〈守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります〉

1. 次の部位には使用しないでください。
(1) 水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は傷口、化膿している患部
(2) 目の周囲、粘膜（例えば口唇等）
2. 顔面には広範囲に使用しないでください。
3. 長期間連用しないでください。



相談すること


1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(4) 患部が広範囲な人
(5) 湿潤やただれのひどい人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

【効能・効果】

かゆみ、虫さされ、かぶれ、あせも、じんましん、ただれ、湿疹、皮膚炎、しもやけ



【用法・用量】

1 日数回、適量を患部に塗布してください。

＜用法・用量に関する注意＞

1. 定められた用法・用量をお守りください。
2. 小児に使用させる場合には特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
3. 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状の重い場合には眼科医の診療を受けてください。
4. 患部を搔かないでください。薬剤にアルコールが含有されているため、塗布した時にしみる場合があります。
5. 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

【成分・分量】

成 分	含 量 (100g中)	は た ら き
デキサメタゾン酢酸エステル	0.025g	はれ・赤み等の炎症を鎮めます。
グリチルレチン酸	0.3g	虫さされなどによる炎症を抑えます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	患部に対する殺菌作用があります。
l-メントール	3.0g	鎮痛作用を有し、清涼感のある刺激作用により痛みやかゆみをやわらげます。
dl-カンフル	2.0g	

添加物：カルボキシビニルポリマー、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ジイソプロパノールアミン、イソプロパノール、エタノール

【保管及び取扱い上の注意】

1. 使用後は、必ずキャップをきちんと閉めてください。車の中など高温になる場所や、直射日光の当たる場所をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
4. 火気に近づけないでください。
5. 時計、めがね等の金属類、化学繊維の衣類、プラスチック類、塗装のしてある床・家具等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
6. 衣類や寝具に付着した場合は、なるべく早く水又は洗剤で洗ってください。
7. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製品についてのお問い合わせ

- お買い求めの販売店
- ジャパンメディック株式会社 お客様相談窓口：076-438-1107
〔受付時間：月～金（祝祭日・年末年始を除く）9：00～17：00〕

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）