



使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。



ベンザブロックせき止め液 1回量のみ切りタイプ

のどの痛みを伴う せき・たんを早めに抑える、液剤タイプの 鎮咳去たん薬

特 徴

- せき中枢に作用するジヒドロコデインリン酸塩、グアイフェネシンなどの鎮咳去たん成分に加えて、痛み・ハレを抑えるトラネキサム酸を配合。のどの痛みを伴う せき・たんによく効きます。
- スッキリとしたメントール味で、甘さを抑えたサラッとしたのみごちの褐色澄明な液剤です。
- 1回量をのみ切り包装としているため、忙しいときでも場所を選ばず服用できます。

第2類医薬品



⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他の鎮咳去たん薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗り物酔い用薬、アレルギー用薬、催眠鎮静薬)、鎮静薬、トラネキサム酸を含有する内服薬
2. 服用後、乗り物または機械類の運転操作をしないこと
(眠気があらわれることがある。)
3. 過量服用・長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること
 - (1) 医師または歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 本人または家族がアレルギー体質の人。
 - (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (7) 次の症状のある人。
高熱
 - (8) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、腎臓病、甲状腺機能障害、血栓のある人(脳血栓、心筋梗塞、血栓性静脈炎)、血栓症を起こすおそれのある人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胸やけ
精神神経系	めまい

 - (2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談すること
便秘、下痢

効 能

のどの痛みを伴う せき・たん

用法・用量

次の1回量を、1日3回、必要な場合には1日4回まで服用することができる。
ただし、服用間隔は4時間以上あけること。

年 齢	1回量
15歳以上	1本(10mL)
15歳未満	服用しないこと

＜用法・用量に関連する注意＞
用法・用量を厳守すること。

成 分


 1本(10mL、1回量)中

は た ら き	成 分	含 量
せきを和らげる	ジヒドロコデインリン酸塩	5mg
	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	12.5mg
たんを排出しやすくする	グアイフェネシン	50mg
	セネガ流エキス	0.1mL (セネガ100mgより抽出)
のどの痛みを和らげる	トラネキサム酸	70mg

添加物：還元麦芽糖水アメ、スクラロース、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、l-メントール、パラベン、安息香酸Na、カラメル、香料、エタノール、プロピレングリコール、グリセリン

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (4) キャップの開栓時、手指にケガをしないよう注意すること。



包 装

 3本入り(10mL×3本)、6本入り(10mL×6本)

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

武田薬品工業株式会社 ヘルスケアカンパニー「お客様相談室」
〒103-8668 東京都中央区日本橋二丁目12番10号 ☎0120-567087
受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

- タケダ健康サイト(パソコン用) <http://takeda-kenko.jp>
- タケダ健康モバイルサイト(携帯電話用) <http://tkdm.jp>

製造販売元  **武田薬品工業株式会社**

〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号