

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。 目薬

ROHTO

EYE DROPS・12mL 第2類医薬品



Refresh Your Eyes.
疲れ目・充血も爽快にリフレッシュ
瞳、深呼吸するような気持ちよさ

"Wow, what a feeling!" "Strong yet soft, the indescribable sensation is truly long lasting."
"The sensation spreads through my brain—I feel wide awake. My eyes are purified and-
refreshed." – It's "ROHTO Z!". Feel it!

販売名：ロートジー® b

マルチパーパス 対応清涼系目薬

ロートジー® bは、さまざまな機能を持つ成分をバランス配合しているので疲れ目などに効果的です。

ビタミンB6（目の新陳代謝を促進し、疲労時の回復力を高める） 塩酸テトラヒドロゾリン（目の充血を取り除く）

L-アスパラギン酸カリウム（細胞呼吸を促進する） ネオスチグミンメチル硫酸塩（目の調節機能を改善する）

クロルフェニラミンマレイン酸塩（目のかゆみをしずめる） 硫酸亜鉛水和物（紫外線などによる目の炎症をしずめる）

いつでも、どこでも、スムーズに点眼できる **フリーアングルノズル®**



"Z!(ジー)"したい時、簡単にアイケアできて、
とっても便利です。
自由な角度で点眼OK!

こんなときなどにも



読書やパソコン・携帯電話などで目に疲れを感じたときに
目の疲れやかすみも爽快にリフレッシュ!



スポーツ時などに
硫酸亜鉛水和物配合で、紫外線などによる炎症もしずめます。
また、水泳あとなどの眼病予防にも効果的。



寝不足のときなどの目の充血や疲れに
栄養成分配合。新陳代謝を促進し、目の疲労時の回復力を高めます。
充血除去剤も配合。疲れ目もシャキッと爽快クール。



ドライブ時などに
長時間のドライブなど目の疲れを感じたときの
瞳のリフレッシュに。

使用上の注意

相談すること



- 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人・・・はげしい目の痛み
 - 次の診断を受けた人・・・緑内障

- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
 - 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

- 目のかすみが改善されない場合
- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

目の疲れ、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、結膜充血、目のかゆみ、眼瞼炎（まぶたのただれ）、目のかすみ（目やにの多いときなど）

用法・用量

1回2～3滴、1日5～6回点眼してください。

●用法・用量に関連する注意

- 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがありますので用法・用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。[汚染や異物混入（目やにやホコリ等）の原因となる]また、混濁したものは使用しないでください。
- ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- 点眼用にのみ使用してください。

容器の先と



目やまつ毛が
ふれることのないように

成分

塩酸テトラヒドロゾリン・・・・・・・・・・0.05%
ネオスチグミンメチル硫酸塩・・・・・・・・0.003%
硫酸亜鉛水和物・・・・・・・・・・・・・・0.05%

クロルフェニラミンマレイン酸塩・・・0.03%
ビタミンB₆・・・・・・・・・・・・・・0.1%
L-アスパラギン酸カリウム・・・・・・・・・・1%

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、L-メントール、d-カンフル、ハッカ油、エデト酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ヒプロメロース、クロロブタノール、pH調節剤を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- 他の人と共用しないでください。
- 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
- 容器に他の物を入れて使用しないでください。



キャップの 開閉方法



キャップの開け方
キャップを手前に
ひねってください。



キャップの閉め方
カチッと音がするまで
押し下げてください。

※容器全体を支えるように持ち、キャップを上にして開閉してください。容器の中央部分だけを持って開閉すると、薬液がとびだし、もれることがあります。

お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京：03-5442-6020 大阪：06-6758-1230

受付時間9：00～18：00（土、日、祝日を除く）