

服用前に説明文を
必ずお読みください。

【効能・効果】

胃痛、腹痛、胃部不快感、胃炎、胃のもたれ、胃酸過多、げっぷ、胸やけ、はきけ、食欲不振、腹部膨満感

【用法・用量】

次の量を食前または食間に服用してください。食間(食事と食事の間)の服用は、食後2~3時間を目安にしてください。

年齢	成人(15歳以上)	5歳以上15歳未満	5歳未満
1回量	1包	1/2包	
服用回数	1日3回		服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉①定められた用法・用量を厳守してください。②小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】1包(1.2g)中

安中散 700mg (下記生薬の混合粉末)：

ケイヒ 200mg、エンゴサク 150mg、ボレイ末 150mg、ウイキョウ 75mg、シユクシヤ 50mg、カンゾウ 50mg、リョウキョウ 25mg

芍薬甘草湯エキス末 170mg (下記生薬の抽出乾燥エキス末)：

シャクヤク 340mg、カンゾウ 340mg

※添加物として、カルメロースNa、トウモロコシデンプン、乳糖を含有します。

〈成分に関連する注意〉本剤は生薬を用いた製剤であるため、製品により色が多少異なることがあります。品質に問題はありません。



外箱

製造番号(LOT)
使用期限(EXP)※西暦/月

6104
2025/05



K-select

漢方 胃腸薬 SP 細粒

安中散

芍薬甘草湯

8種類の生薬成分配合

50包

胃もたれ
胸やけ
胃の不快感に



第2類医薬品

2つの漢方処方を配合

胃もたれ・胸やけ・胃の痛みなど
胃腸の諸症状の改善に効果を発揮

あんちゅうさん

安中散

胃腸のはたらきを活発にして
胃もたれ・胃部不快感を改善

しゃくやくかんそうとう
芍薬甘草湯

胃腸の筋肉の緊張をやわらげ
胃痛・腹痛の症状を緩和



服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

●次の人は服用しないでください。▷心臓病の診断を受けた人

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。①医師の治療を受けている人②妊婦または妊娠していると思われる人③高齢者④今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人⑤むくみのある人⑥高血圧、腎臓病の診断を受けた人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに、下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

症状の名称	症状
うつ血性心不全、心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振があらわれる。

- 3.1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
- 4.次の場合は、服用中又は服用後に、医師、薬剤師、または登録販売者に相談してください。▷長期連用する場合

【保管及び取扱い上の注意】

- 1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。
- 4.1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- 5.使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

販売名：漢方胃腸薬「SP」(細粒)

第2類医薬品

SP 製造販売元(輸入元)
株式会社サイキョウ・ファーマ
東京都江東区亀戸5丁目6番21号
お客様相談窓口(受付:平日10:00~16:00)

副作用被害救済制度の
お問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
フリーダイヤル 0120-149-931

☎ 0120-456-787

www.saikyo-pharma.co.jp

SP001