

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

持続性鼻炎用内服薬 第②類医薬品

新ノスポール鼻炎カプセル

新ノスポール鼻炎カプセルは、すぐに溶けて効果をあらわす粒と、一定の時間が過ぎてから効果をあらわす粒を組み合わせていますので、作用が持続します。そのため、1日に朝・夕2回の服用で症状の改善をはかることができます。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないで下さい。

(1) 本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2) 次の症状のある人。

前立腺肥大による排尿困難

(3) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、塩酸フェニルプロパノールアミンを含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)

4. 長期連用しないで下さい。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 高齢者。

(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。

(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(6) 次の症状のある人。

高熱、排尿困難

(7) 次の診断を受けた人。

緑内障

(8) モノアミン酸化酵素阻害剤(塩酸セレギリン等)で治療を受けている人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛
その他	排尿困難、顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。

(2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

口のかわき、便秘

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：
くしゃみ、鼻水、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭が重い

用法・用量

次の量を朝夕服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1カプセル	2回
15歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 用法・用量を厳守して下さい。

(2) カプセル剤の取り出し方

図のようにカプセル剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)

〈カプセルの取り出し図〉



成分・分量

1日量(2カプセル)中、次の成分を含有します。

成分	分量
塩酸プソイドエフェドリン	70mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	8mg
ベラドンナ総アルカロイド	0.4mg
リゾチーム塩酸塩	60mg(力価)
無水カフェイン	100mg

添加物として、トウモロコシデンプン、乳糖、セルロース、ヒドロキシブ
ロピルセルロース、カルメロースCa、エチルセルロース、グリセリン脂
肪酸エステル、タルク、部分アルファ化デンプン、カプセル本体にゼ
ラチン、ラウリル硫酸Naを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの
お店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口：協和薬品工業株式会社 お客様相談室

☎ 0120-468771

受付時間 9:00～12:00・13:00～17:00(土、日、祝日を除く)



協和薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市野一色2丁目8番6号

本社：東京都世田谷区上祖師谷1丁目11番3号