

2011年12月作成

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時にすぐ読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

目の疲れ・目のかすみ・充血

(目やにの多いときなど)

15mL

マイビーアイクリアα

「マイビー アイクリアα」は、2つの生薬由来成分を含む9つの有効成分をバランス良く配合し、「目の疲れ」・「目のかすみ(目やにの多いときなど)」・「充血」だけでなく「眼病予防」にも優れた効き目を発揮する「眼科薬」です。

有効成分9種配合

疲れ目を改善する

ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)

バンテノール

タウリン

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

目の炎症を鎮める

イブシロン-アミノカプロン酸

ベルベリン硫酸塩水和物(黄柏由来成分)

グリチルリチン酸二カリウム(甘草由来成分)

充血・かゆみを抑える

塩酸テトラヒドロソリン

クロルフェニラミンマレイン酸塩



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人: はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人: 緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼腺炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

用法・用量

1回2～3滴, 1日3～6回点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 過度に使用すると, 異常なまぶしさを感じたり, かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には, 保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先が, まぶたやまつ毛などに触れると, 目やにや雑菌などのため, 薬液が汚染または混濁することがありますので注意してください。また, 混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 本剤は, 点眼用のみ使用してください。

成分・分量 (100mL中)

塩酸テトラヒドロソリン	50mg	イブシロン-アミノカプロン酸	1500mg
ベルベリン硫酸塩水和物	10mg	グリチルリチン酸二カリウム	250mg
(黄柏由来成分)		(甘草由来成分)	
クロルフェニルミンマレイン酸塩	30mg	ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	50mg
バンテノール	100mg	タウリン	1000mg
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	250mg		
添加物として, エデト酸Na水和物, ホウ酸, d-ボルネオール, l-メントール, 塩化Na, クロロブタノール, パラベンを含有しています。			

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は点眼後, ときに口中に甘味を感じることがあります。これは成分であるグリチルリチン酸二カリウムが涙道を通して口中に流れ出てくることによるもので, 品質などの異常によるものではありません。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。特に車のダッシュボード等, 高温下に放置すると, 容器の変形や薬液の変化を生じるおそれがあります。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり, 品質が変わる)。
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。また, 使用期限内であっても, 開封後はできるだけ速やかに使用してください。
- (6) 本剤の黄色は「ベルベリン」の色です。黄色い液が衣服などにつかないよう, 十分注意してください。また, 点眼される際には, ティッシュを目の下に当ててお使いになることをお勧めします。
- (7) 保存状態によっては, 成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとってから使用してください。

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは, お買い求めの薬局・薬店, 又は下記までお願い申し上げます。

佐賀製薬株式会社 お客様相談窓口

電 話: **0942-92-5656**

受付時間: 午前9:00～午後5:00(土, 日, 祝日を除く)

発 売 元  **三共製薬工業株式会社** 〒530-0043 大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元 **佐賀製薬株式会社** 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町小倉481