

発熱性消耗性疾患などの
場合の栄養補給

キリーゼ・リコ

開け口

第2類医薬品

30mL×3



【成分・分量】1日量(30mL×2)中
タウリン(アミノエチルスルホン酸)2000mg、カン
ゾウエキス1000mg、ニンジンエキス60mg、ビロ
ドキシリン塩酸塩(ビタミンB6)50mg、パンテ
ン酸30mg、添加物・果糖、ポリリン酸Na、アルギ
ン酸プロピレングリコールエステル、パラベン、
デヒドロ酢酸Na、エタノール、プロピレングリ
コール、香料

【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体的疲労・病中病後・食
欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産
後などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上)1回1瓶(30mL)を1日2
回服用してください。

○用法・用量を厳守すること。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)
小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に
入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
※本剤は生薬成分を配合していますので、沈殿を生じる
ことがあります。よく振ってから服用してください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お客様相談室：0595-21-3200
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 中外医薬生産株式会社
三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

製造番号

使用期限

△使用上の注意

⊗してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)
長期連用しないこと

■相対すること

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。(2)高齢者 (3)次の症状のある人。
むくみ (4)次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、腎臓病

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに
服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに
医師の診察を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわ ばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、 徐々に強くなる。

3.5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この
製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給

第2類医薬品

30mL×3

熱で体が
だるい

カンゾウエキス

ニンジンエキス

タウリン配合

キリーゼ・リコ

食欲がない

発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給

熱で体が
だるい

食欲がない

そんな時の
栄養補給

カンゾウエキス

ニンジンエキス

タウリン配合

第2類医薬品

30mL×3

キリーゼ・リコ

発熱性消耗性疾患などの場合
の栄養補給 第2類医薬品

熱で体が
だるい

食欲がない

そんな時の
栄養補給

カンゾウエキス

ニンジンエキス

タウリン配合

30mL



4 987307 421607



ガラス：ビン
金 属：キャップ

01KJECVV