

発熱性消耗性疾患などの場合  
の栄養補給 第2類医薬品

熱で体が  
だるい

食欲がない

そんな時の

栄養補給

カンゾウエキス

ニンジンエキス

キリージェ・リコ

タウリン配合

30mL

第2類医薬品

△【使用上の注意】

☒ [してはいけないこと]  
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)  
長時間連続しないこと

■【相談すること】  
1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1)医師の治療を受けている人。(2)高齢者(3)次の症状のある人。むくみ(4)次の診断を受けた場合。心臓病、高血圧、腎臓病  
2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持てて医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

[問合せ部位] 発熱・発赤・かゆみ

まれに以下の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

[症状の名前] 症 状  
偽アルブミンステロイド、手足のだるさ、しづれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛がからむられ、様子に強くなる。  
ニオババード

3.5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持てて医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【成分・分量】1日量(30mL×2)中 【用法・用量】  
タウリン(アミノプロピルスルホン酸) 成人(15歳以上) 1回1瓶(30mL)を1日2回  
2000mg、カンゾウエキス1000mg、服用してください。服用間隔は4時間以上お  
こなさい。ニンジンエキス80mg、タウリン(アラニン)50mg、  
シナモンペール30mg、添加物:果糖、  
ボリジン酸Na、アルギン酸プロレーン、  
シナモンペールエチル、バラベーン、  
シナモンペールエタノール、ブリッピンググリーアル、香料

【保存・効果】  
温湿気、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の  
手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこ  
と(誤用の原因になつたり品質が変わる。)。(4)使用期限を過ぎた  
製品は服用しないこと。

※本剤は生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがあり  
ます。よく振ってから服用してください。

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病  
中病後、食欲不振・栄養障害・発熱、副作用相殺薬酒済用酒 質 0120-149-931

性消耗性疾患・産前産後などの場合の必要補給

ガラスビン 金属:キャップ 01KJELVV

中外医薬生産株式会社

製造販売元 三重県伊賀市ゆめか丘7-5-5

お客様相談室 : 0595-21-3200

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)



4 987307421591