熱で体がだるい、食欲がない

そんな時の

栄養補給

1日2回服用

ノンカフェイン　30mL

カンゾウエキス、ニンジンエキス、タウリン配合

キリージェ・リコ

第2類医薬品

キリージェ・リコ　第2類医薬品

【使用上の注意】

■してはいけないこと
（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。）
長期連用しないこと
※

■相談すること　1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること　(1) 医師の治療を受けている人。(2) 高齢者。(3) 次の症状のある人。むくみ　(4) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、腎臓病

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3.5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【成分・分量】1日量（30mL×2）中
タウリン（アミノエチルスルホン酸）2000mg、カンゾウエキス1000mg、ニンジンエキス60mg、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）50mg、パンテノール30mg、添加物：果糖、ポリソルベート80、安息香酸Na、アルギン酸プロピレングリコールエステル、パラベン、デヒドロ酢酸Na、エタノール、プロピレングリコール、香料

【効能・効果】
滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給
※この商品は株式会社大木との共同開発商品です。

【用法・用量】
成人（15歳以上）1回1瓶（30mL）を1日2回服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。○用法・用量を厳守すること。

【保管及び取扱い上の注意】
(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる。）。(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
※本剤は生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがありますよく振ってから服用してください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

ガラス：ピン　金属：キャップ　01KJELOK

製造番号

使用期限

製造販売元　中外医薬生産株式会社
岐阜県伊賀市ゆめが丘3-23-2
お客様相談室：0595-21-3200
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

4 987307 422703