



2012年11月第2版

ご使用前に、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

販売名 ラフェルサのどスプレー

口腔咽喉薬

第3類医薬品

ラフェルサ[®]
のどスプレー

のどの炎症による痛み、ハレ、声がれ



特長

- ・有効成分「ポビドンヨード」がのどの炎症の原因となっている細菌などを殺菌します。
- ・メントールを配合していますので、口の中がスッキリします。
- ・患部に薬液がまっすぐ届くノズルを使用しています。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の診断を受けた人。甲状腺機能障害。
- (4) 次の症状のある人。口内のひどいただれ。
- (5) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (6) 授乳中の人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気
そ の 他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診断を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、 のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】 のどの炎症によるのどあれ・のどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ

【成分・分量】 100mL中 ポビドンヨード……………0.45g
添加物としてヨウ化カリウム、*l*-メントール、還元麦芽糖水アメ、グリセリン、プロピレングリコール、エタノール、サッカリン Na、香料を含有する。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

【用法・用量】 1 日数回適量をのどの粘膜面に噴射塗布してください。


〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 息を吸いながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルを患部にむけて、軽く息をはきながら、2～3回直射してください。
- (3) 本剤はのどの患部への噴射塗布だけに使用し、傷ややけどへの使用や、内服はしないでください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。

なお、症状が重い場合には、眼科医の診断を受けてください。

〈使用方法〉

- ① 容器のフタを
はずしてください。




- ② 「アー」と声を出しながら
頭部を押して、患部に薬液を
2～3回直射してください。

※最初は液が出るまで4～5回
押してください。
※頭部をゆっくり押さないでください。
液だれを起こす場合があります。



- ③ 使用後は、フタをもとの位置
にはめてください。

※薬液がノズルの先端にたまった時は、
液だれを防ぐため、清潔なティッシュ
ペーパー等で拭き取ってください。



ノズルの先端を針等で突くと
薬液が出にくくなったり、
折れた時大変危険です。絶対に
おやめください。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)
- (4) 薬液が衣服等に付着すると着色します。なお、付着した場合はすぐに水でよく洗い落としてください。
- (5) 携帯する時は添付のチャック袋に入れ、しっかりと封をしてください。
- (6) ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。使用時に薬液が出にくくなる場合があります。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (8) 温度の低い場所で保管された場合、薬液が出にくくなる場合があります。その場合は手のひらなどで温めてから使用してください。

本製品について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただき
ますようお願い申し上げます。

発売元 **グレートアンドグラント株式会社** 製造販売元 **ダイヤ製薬株式会社**
〒541-0045 大阪市中央区道修町2-1-10 〒634-0803 奈良県橿原市上土寺町515

お客様相談室 TEL: 0744-21-5588
受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)