

NIKKO

第3類医薬品

エタプロコールA

殺菌消毒剤

500mL

飲用不可

貯 法：火気を避けて室温保存
使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)
注 意：取扱い上の注意の項参照



製造販売元
日興製薬株式会社
岐阜県羽島市江吉良町1593

使用に際して、この説明を必ず読んで下さい。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
次の部位には使用しないで下さい。

粘膜(口唇等)、目の周囲、傷口

相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人または家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が広範囲の人。
- (5) 深い傷やひどいやけどの人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師または薬剤師に相談して下さい。

使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、灼熱感等

3. 長期使用する場合には、医師または薬剤師に相談して下さい。

【効能・効果】

創傷面の殺菌・消毒

【用法・用量】

本液を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部に軽く塗布します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないで下さい。
- (3) 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあります。
- (4) 広範囲または長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意して下さい。
- (5) 小児に使用させる場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。
- (6) 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には直ちに眼科医の診療を受けて下さい。
- (7) 外用にのみ使用し、内服しないで下さい。

【組成・性状】

有効成分	エタノール(C ₂ H ₆ O)	76.9~81.4vol%
添 加 物	イソプロパノール(溶剤)	2.91w/v%
性 状	無色透明の液で、特異なおいがある。	

〈成分に関連する注意〉

アレルギーテストの検査を受ける場合には、本剤を使用していることを医師に知らせて下さい。(アレルギーテストの検査値に影響をおよぼすことがあります。)

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 火気に近づけないで下さい。
- (5) 開封時、容器の肩部または底部を持ち、液がとびださないように、キャップを開けて下さい。

副作用被害救済制度のお問合せ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

火気厳禁

第4類

アルコール類

水溶性

危険等級Ⅱ



容 器：PE
キャップ：PP

製造番号

使用期限