

Hisamitsu

20枚入

サロパスの
密着浸透力®

ジーンとした刺激が痛みに効く

サロパス®

EX 温感

インドメタシン
3.5%

心地よい温感刺激

目立たない色

微香性

鎮痛消炎プラスター

サイズ:
5.4cm×8.56cm

第2類医薬品

20枚入

第2類医薬品

インドメタシン
3.5%配合

EX 温感

サロパス® EX

ジーンとした刺激が痛みに効く

4 987188 100478

特長

- 1.インドメタシン3.5%配合の優れた鎮痛消炎効果。
 - 2.温感作用により患部の血行を促進し肩こり等による痛みをやわらげます。
 - 3.肩こりの関係部位(肩、首の付け根、肩甲骨周辺)などに貼りやすいサイズ。
 - 4.微香性なので使っていることが気にならない。
- サロパスの「密着浸透力」とは、サロパスを肩こりや腰痛などの時に皮ふにぴったりと貼り患部をおおうことで、有効成分が皮ふから深く浸透し痛みをジカにとります。それがサロパスの「密着浸透力」です。

△使用上の注意

×してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

- 1.次の人は使用しないでください。
 - (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3) 11歳未満の小児。
- 2.次の部位には使用しないでください。
 - (1) 目の周囲、粘膜等。
 - (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
 - (3) みずむし・むし等又は化膿している患部。
- 3.連続して2週間以上使用しないでください。

■相談すること

- 1.次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感、かぶれ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなりません。

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

ここを
押し開けて
ください。

第2類医薬品

販売名:サロパスEX温感

この説明文書は本剤とともに保管し、使用の際にはよくお読みください。



用法・用量

表面のプラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として、患部に貼ってください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。(3) 皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(4) 強い刺激を感じることがあるので、入浴の1時間前には本剤をはがしてください。また、入浴後に貼る場合は30分位してから貼付してください。(5) 患部の皮ふは清潔にして貼ってください。(6) 皮ふの特に弱い人は同じ所には続けて貼らないでください。(7) 打撲、捻挫等に本剤を使用する場合は、腫れがひいてから使用してください。

成分・分量

成分含量(膏体100g中)
 インドメタシン.....3.5g
 l-メントール.....3.5g
 トウガラシエキス.....0.3g
 添加物として、エチル・酸Na、脂環族飽和炭化水素樹脂、ステレン・インプレッ・スチレンブロック共重合体、BHT、ポリイソブチレン、流動パラフィン、その他2成分を含有します。

保管及び取り扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部をおりまげきちんと閉めて保管してください。(5) 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の当社製造販売所「お客様相談室」までお願い申し上げます。

お客様相談室 ☎ 0120-133250 〒100-6221 東京都千代田区丸の内1-11-1

受付時間 9:00～12:00、13:00～17:50(土、日、祝日を除く)

制作用特許事務書類のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkoungai.html

☎ 0120-41-49-931



1B-A2T