



ジーンとした刺激が痛みに効く

サロンパスEX 温感

第2類医薬品

20枚入

サイズ：
5.4cm×8.56cm

Hisamitsu

20枚入

ジーンとした刺激が痛みに効く

Salonpas

サロンパスEX

温感 インドメタシン 3.5%



当社従来品に比べて包装サイズを
小さくしました。

心地よい温感刺激

目立たない色

微香性

サイズ：
5.4cm×8.56cm

鎮痛消炎プラスター

セルフメディケーション

税 控除 対象

第2類医薬品

製造番号

使用期限

第2類医薬品

サロンパスEX 温感



サロンパスEX 温感
第2類医薬品

※本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。
久光製薬株式会社
〒841-0017 鳥飼市代々宮町408番地

お客様相談室：TEL.0120-133250
受付時間：9:00～17:50（土日・祝日・会社休日を除く）
副作用発生報告制度 ☎0120-149-931




88A32T



サロンパスEX 温感
第2類医薬品

サロンパスの「密着浸透力」とは、
サロンパスを貼った部位の皮膚の温度が上がり、有効成分が外部
に滲透し、皮膚から深く浸透し痛みをシブシブと
取り除く効果があります。



874001 88186 7

第2類医薬品

販売名：サロンパス®EX
温感

特長

- インドメタシン3.5%配合の優れた鎮痛消炎効果。
- 温感作用により患部の血行を促進し肩こり等による痛みをやわらげます。
- 肩こりの関係部位（肩、首の付け根、肩甲骨周辺）などに貼りやすいサイズ。
- 微香性なので使っていることが気にならない。

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用【が起りやすくなります。】

1. 次の人は使用しないでください。
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3) 11歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください。
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。(3) みずむし・たむし等又は化粧している患部。
3. 連続して2週間以上使用しないでください。

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感、かぶれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりません場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

ここを
押し開けて
ください。

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

Salonpas®

詳しい
情報は
こちらへ



▼久光製薬の環境への取り組み
HELLO!eco!プロジェクトの
詳細はこちらへ。
<https://www.hisamitsu.co.jp>

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎（手・首の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、ねんざ

用法・用量

表面のプラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として、患部に貼ってください。

＜用法・用量に関連する注意＞

(1) 11歳未満の小児に使用させないでください。(2) 11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。(4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(5) 強い刺激を感じることがありますので、入浴の1時間前には本剤をはがしてください。また、入浴後は30分位してから使用してください。(6) 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。(7) 皮膚の弱い人は同じ所には続けて貼らないでください。(8) 打撲、ねんざ等に本剤を使用する場合は、はれがひいてから使用してください。

成分・分量（膏体100g中）

インドメタシン…3.5g ｌ-メントール…3.5g
トウガラシエキス…0.3g

添加物として、エチル酸ナトリウム水和物、脂環族炭酸水素樹脂、ステレン・イソブレン・ステレンブロック共重合体、BHT、ポリイソブチレン、流動パラフィン、その他2成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります）。(4) 未使用分は袋に入れ、開口部をおりまげきんと閉めて保管してください。(5) 使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。