

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

虫さされ・かゆみに エプールEX液

第2類医薬品

主成分のプレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルは、アンテドラッグといわれる種類のステロイド剤です。アンテドラッグとは、皮膚表面の患部で効果を示し、体内に吸収されると低活性となる薬剤のことです。湿疹、じんましん等の炎症をしずめるプレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルに、かゆみを抑えるジフェンヒドラミン塩酸塩を配合しています。イソプロピルメチルフェノールは、殺菌効果があります。l-メントール、dl-カンフルは、清涼感を与えかゆみをしずめます。本剤は、アルコール類を基剤とする透明の液体で、患部に軽く塗布するだけで爽快感を与え、皮膚へのなじみもよく、速やかに乾燥し、べつつかず衣類をよごしません。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください。

- (1)水痘(水ぼうそう)、みずむし、たむし等又は化膿している患部。
- (2)創傷面、目の周囲、粘膜等。

2. 長期連用しないでください。

3. 本剤はステロイド剤(副腎皮質ホルモン剤)プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルを含んでおり、顔面に広範囲又は長期間(2週間以上)塗布すると赤ら顔になることがありますので、顔面に続けて長く使用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4)患部が広範囲の人。
- (5)湿潤やただれのひどい人。
- (6)妊婦又は妊娠していると思われる人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1)使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮ふ(患部)	みずむし・たむし等の白癬菌、にきび、化膿症状、持続的な刺激感、発疹

(2)5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

裏面もお読みください。

【効能・効果】

虫さされ、かゆみ、しっしん、皮膚炎、かぶれ、じんましん、あせも

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) キャップをとりはずし、スポンジ部分を肌に1～2回軽く押し当てて、スポンジに薬液をしみ込ませてからご使用ください。
- (2) 定められた用法・用量を守ってください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。

【成分・分量】 100mL中に次の成分を含みます。

成 分	分 量	働 き
プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル (アンテドラッグステロイド剤)	0.15 g	湿疹、じんましん等の炎症をしずめます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0 g	抗ヒスタミン作用により、かゆみ発生を抑えます。
l-メントール	3.5 g	清涼感を与え、かゆみをしずめます。
dℓ-カンフル	1.0 g	清涼感を与え、かゆみをしずめます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1 g	殺菌効果があります。

添加物として、ジブチルヒドロキシトルエン、1,3-ブチレングリコール、エタノールを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 高温・直射日光をさけ、涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) メガネ、時計、アクセサリ、プラスチック類、繊維製品、皮革製品、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (6) 使用期限(外箱及び容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
- (7) 使用後は必ずキャップを十分にしめてください。

本品についてのお問い合わせは
お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

万協製薬株式会社

電話 0598-37-2088

受付時間 AM10:00～PM5:00

(ただし、土、日、祝祭日を除きます。)



発売元

日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3-46-16

<http://www.nippo-yakuhin.jp/>

製造販売元



万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142

A2104