

この説明文書はお薬とともに保管してください。また服用時によくお読みください。

ビタミンB₁・B₆・B₁₂製剤

アリナエコーEXP

第3類医薬品

【特徴】 ビタミンB₁誘導体フルスルチアミン、ビタミンB₆、ビタミンB₁₂を配合し、「目の疲れ」「肩こり」「腰の痛み」などの症状にすぐれた効果をあらわします。

また、パントテン酸カルシウムは補酵素（コエンザイムA）となってエネルギーの産生に重要な働きをし、ビタミンEは体のすみずみの血液循環を改善します。

【成分・分量】3錠（1日最大服用量）中

成 分	含 量
フルスルチアミン塩酸塩（ビタミンB ₁ 誘導体） （フルスルチアミンとして）	109.16mg （100mg）
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）	100mg
シアノコバラミン（ビタミンB ₁₂ ）	1,500μg
トコフェロールコハク酸エステルカルシウム（ビタミンE） （dl-α-トコフェロールコハク酸エステルとして）	103.58mg （100mg）
パントテン酸カルシウム	30mg
ガンマーオリザノール	10mg

添加物として乳酸Ca水和物、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、セラセフェート、セルロース、パレイショデンプン、乳糖水和物、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、白糖、アラビアゴム末、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、タルク、酸化チタン、リボフラビンリン酸エステルNa、カルナウバロウを含む。

【効能・効果】 1.次の諸症状の緩和：眼精疲労、筋肉痛・関節痛（肩こり、腰痛、五十肩など）、神経痛、手足のしびれ
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

2.次の場合のビタミンB₁B₆B₁₂の補給：肉体疲労時、病中病後の体力低下時、妊娠・授乳期

【用法・用量】 次の量を食後すぐに水又はお湯で、服用すること。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2～3錠	1回
11歳以上15歳未満	1～2錠	
11歳未満	服用しないこと	

製造販売元 寧薬化学工業株式会社

〒635-0035 奈良県大和高田市旭南町2番25号

SA3815100326

日方活力康糖衣錠

ARINAECHO EXP

衛署藥輸字第 024810 號

【成分・份量】 1日量(3錠)中

成 分	含 量
FURSULTIAMINE HYDROCHLORIDE (=FURSULTIAMINE)	109.16mg (100mg)
PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE	100mg
CYANOCOBALAMIN	1,500 μ g
TOCOPHEROL CALCIUM SUCCINATE (=TOCOPHEROL SUCCINATE)	103.58mg (100mg)
CALCIUM PANTOTHENATE	30mg
γ -ORYZANOL	10mg

【適應症】 維生素 B1、B5 (泛酸鈣)、B6、B12 及維生素 E 缺乏症

【用法・用量】

年 齡	1 次量	1 天服用次數
成人 (15 歲以上)	2~3 錠	1 回
11 歲以上未滿 15 歲	1~2 錠	1 回

※醫師藥師藥劑生指示藥品

【警語】

- 服用前請詢問醫師、藥師、藥劑生。
- 發生下列的情況時，應停藥立即就醫。
(1) 服用後，出現下列的症狀

關係部位	症 狀
皮 膚	起疹子、發癢、發紅
消化器官	噁心、嘔吐、口內炎、食慾不振

- (2) 服用一個月後症狀仍無改善。

3. 生理期比預定時間提早來臨，經期出血量多且不斷出血，應停藥立即就醫。
4. 當服用本藥劑後出現便秘、軟便、下痢，而且症狀持續或加強時，要應停藥立即就醫。

【注意事項】

- (1) 避免陽光直射，宜保存於乾燥陰涼之處，
【儲藏條件】保存於 25℃ 以下。
- (2) 為防止兒童誤食，請妥善保管。
- (3) 為避免誤用及變質，請勿改裝於其他容器中。

【包裝】 90・120 錠玻璃瓶裝

製造廠：NEIYAKU KAGAKU CO., LTD.

2-25 ASAHIMINAMI-CHO

YAMATOTAKADA-SHI NARA JAPAN

藥商：德佑藥品有限公司

台北市敦化南路一段3號2樓