

この説明文書はお薬とともに保管してください。また服用時によくお読みください。

ビタミンB₁・B₆・B₁₂製剤

アリナエコーEXP

第3類医薬品

【特 徴】

ビタミンB₁誘導体フルスルチアミン、ビタミンB₆、ビタミンB₁₂を配合し、「目の疲れ」「肩こり」「腰の痛み」などの症状にすぐれた効果をあらわします。また、パントテン酸カルシウムは補酵素(コエンザイムA)となってエネルギーの産生に重要な働きをし、ビタミンEは体のすみずみの血液循環を改善します。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 軟便、下痢、便秘
4. 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがある。出血が長く続く場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、口内炎、胃部不快感

【成分・分量】3錠(1日最大服用量)中

フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB₁誘導体) 109.16mg(フルスルチアミンとして100mg)、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆) 100mg、シアノコバラミン(ビタミンB₁₂) 1,500μg、トコフェロールコハク酸エステルカルシウム(ビタミンE) 103.58mg(dl-α-トコフェロールコハク酸エステルとして100mg)、パントテン酸カルシウム30mg、ガンマーオリザノール10mg、添加物として乳酸Ca水和物、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、セラセファート、セルロース、パレイショデンプン、乳糖水和物、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、白糖、アラビアゴム末、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、タルク、酸化チタン、リボフラビンリン酸エステルNa、カルナウロウを含む。

- 【効能・効果】 1. 次の諸症状の緩和：眼精疲労、筋肉痛・関節痛(肩こり、腰痛、五十肩など)、神経痛、手足のしびれ(ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。)
2. 次の場合のビタミンB₁B₆B₁₂の補給：肉体疲労時、病中病後の体力低下時、妊娠・授乳期

【用法・用量】 次の量を食後すぐに水又はお湯で、服用すること。

【用法・用量に関連する注意】

1. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
2. 用法・用量を厳守してください。

【保管及び取扱上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
4. **ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防止するためのものですので、開封後に捨ててください。**(本剤は糖衣錠のため、落下などの衝撃で錠剤が破損することがありますので、取扱いは十分ご注意ください。)
5. 容器内の乾燥剤は服用しないでください。
6. 服用のつどビンのキャップをしっかりと閉めてください。(吸湿し品質が変わることがあります。)
7. 錠剤は濡れた手で扱わないでください。(糖衣錠がはげたり変色の原因となります。)
8. 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。
9. 箱の「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。
10. 開封後は、品質を保つ意味で開封日から6ヶ月以内の服用を目安にしてください。

製造販売元 寧薬化学工業株式会社

〒635-0035 奈良県大和高田市旭南町2番25号

SA3815121017

日方活力康糖衣錠

ARINAECHO EXP



衛署藥輸字第 024810 號

【成分·份量】 1 日量 (3 錠) 中

成 分	含 量
FURSULTIAMINE HYDROCHLORIDE (=FURSULTIAMINE)	109.16mg (100mg)
PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE	100mg
CYANOCOBALAMIN	1,500 μ g
TOCOPHEROL CALCIUM SUCCINATE (=TOCOPHEROL SUCCINATE)	103.58mg (100mg)
CALCIUM PANTOTHENATE	30mg
γ -ORYZANOL	10mg

【適應症】 維生素 B1、B5 (泛酸鈣)、B6、B12 及維生素 E 缺乏症

【用法·用量】

年 齡	1 次量	1 天服用次數
成人 (15 歲以上)	2~3 錠	1 回
11 歲以上未滿 15 歲	1 錠	1 回

※醫師藥師藥劑生指示藥品

【警語】

- 服用前請詢問醫師、藥師、藥劑生。
- 發生下列的情況時，應停藥立即就醫。

(1) 服用後，出現下列的症狀

關係部位	症 狀
皮 膚	起疹子、發癢、發紅
消化器官	噁心、噁吐、口內炎、食慾不振

(2) 服用一個月後症狀仍無改善。

3. 生理期比預定時間提早來臨，經期出血量多且不斷出血，應停藥立即就醫。

4. 當服用本藥劑後出現便秘、軟便、下痢，而且症狀持續或加強時，要應停藥立即就醫。

【注意事項】

(1) 避免陽光直射，宜保存於乾燥陰涼之處，

【儲藏條件】保存於 25℃ 以下。

(2) 為防止兒童誤食，請妥善保管。

(3) 為避免誤用及變質，請勿改裝於其他容器中。

【包裝】 90·120·270 錠玻璃瓶裝

製造廠：NEIYAKU KAGAKU CO., LTD.
2-25 ASAHIMINAMI-CHO
YAMATOTAKADA-SHI NARA JAPAN

藥商：德佑藥品有限公司
台北市敦化南路一段 3 號 2 樓
www.dokuyu.com.tw