

下線部：2021年7月改訂（添加物の変更及び成分・分量に関連する注意の追加）

ご使用に際して、この説明文書を必ず読んでください。
また、必要なときに読めるよう本剤とともに保管してください。

しみ、そばかすに

L-システイン配合製剤

第3類医薬品

販売名:ビタトレールホワイト

【特徴】

L-システイン配合製剤（販売名：ビタトレールホワイト）は、L-システイン・ビタミンCなどを配合し、しみやそばかすによく効きます。

- ・L-システインとビタミンCが協力して、しみやそばかすの原因となるメラニンの生成をおさえます。
- ・ビタミンCが黒色メラニンの淡色化を促進します。
- ・ビタミンB₂とニコチン酸アミドが皮膚の新陳代謝を促進し、L-システインとビタミンCの働きを助けて効果を高めます。



使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 下痢
3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。



【効能・効果】

- ・次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- ・次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」
- ・次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

【用法・用量】

次の量を食後服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	2錠	3回
7歳以上15歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないでください	

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 用法及び用量を厳守してください。

【成分・分量】 1日量(6錠)中

成分	分量
L-システイン	160mg
アスコルビン酸(ビタミンC)	500mg
ニコチン酸アミド	60mg
リボフラビン(ビタミンB ₂)	12mg


添加物としてセルロース、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、白糖、タルク、アラビアゴム末、ゼラチン、酸化チタン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、炭酸Ca及びカルナババロウを含有する。

【成分・分量に関連する注意】

- ・本剤の服用により尿が黄色くなる場合がありますが、これは本剤に含まれているリボフラビン(ビタミンB₂)によるもので心配ありません。
- ・アスコルビン酸(ビタミンC)の服用により、尿および大便の検査値に影響を及ぼすことがありますので、尿および大便の検査を受ける場合には、本剤を服用していることを医師にお知らせしてください。

【保管及び取り扱い上の注意】

1. 直接日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
4. **ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防止するためのものですので、開封後に捨ててください。**
(本錠は糖衣錠のため、落下などの衝撃で錠剤が破損することがありますので、取扱いには十分ご注意ください。)
5. ビンの中の包装紙に包まれた平型錠は乾燥剤です。服用しないでください。
6. 服用のつどビンのキャップをしっかりと閉めてください。(吸湿し品質が変わることがあります。)
7. 錠剤は濡れた手で扱わないでください。(糖衣錠がはげたり変色の原因となります。)
8. 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。
9. 箱の「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。
10. 開封後は、品質を保つ意味で開封日から6ヵ月以内の服用を目安にしてください。



【お問い合わせ】

寧薬化学工業株式会社

相談窓口 ☎ 0745-22-4151

9:00~16:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元 寧薬化学工業株式会社

〒635-0035 奈良県大和高田市旭南町2番25号