

SAKAM POW

一歳の子供から大人まで服用できる
飲んですぐ溶ける顆粒

足った!

筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのある
こむらがえり・腹痛・腰痛に

SAKAM POW

一歳の子供から大人まで服用できる
飲んですぐ溶ける顆粒

足った!

筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのある
こむらがえり・腹痛・腰痛に

ドルチエ顆粒 (芍薬甘草湯)

体力に関わらず 使用でき、筋肉の急激な

けいれんを伴う痛みのあるもの次の諸症
こむらがえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

持ち運びに便利な 分包包

第2類医薬品 9包

この箱は本剤とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

【効能・効果】

体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるもの次の諸症：こむらがえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

【用法・用量】

1日2～3回服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人 (15歳以上)	1包	2～3回
7歳以上 15歳未満	2/3包	
4歳以上 7歳未満	1/2包	
2歳以上 4歳未満	1/3包	
2歳未満	1/4包	

※水かお湯で服用してください。

<用法・用量に関連する注意>

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 1歳未満の乳児には、医師の診察を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量】

成人1日量3包(1包2g)中

日局 芍薬甘草湯エキス 2.4g

成分	分量	成分	分量
日局 シャクヤク	6g	日局 カンゾウ	6g

より製した乾燥エキス

添加物：乳糖、バレイシヨテンブ、メタケイ酸アルミン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Mg

※本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、顆粒の色調等が多少異なることがあります。

押して開ける

漢方製剤

第2類医薬品

【販売名】ドルチエ顆粒

△使用上の注意

⊗してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください
(1)生後3ヵ月未満の乳児 (2)次の診断を受けた人：心臓病
- 症状があるときのみの服用にとどめ、連用しないでください

⊠相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人 (4)次の症状のある人：むくみ
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (5)次の診断を受けた人：高血圧、腎臓病
(3)高齢者
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性ありますので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・ 息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急に あらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、 ミオパシー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、 脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
うつ血性心不全、 心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、 めまい、失神等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、 褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

一歳の子供から大人まで服用できる
飲んですぐ溶ける顆粒
足った!

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 湿気などにより薬が固化的することがありますので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様相談室】 ☎ 06-6423-0565
(祝日を除く月～金曜日10:00～17:00)

【製造販売元】

株式会社 阪本漢法製薬
兵庫県尼崎市名神町1-5-12

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



袋：PE、金属



箱

製造番号

使用期限

S6