

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

皮膚炎・かゆみ・湿疹 トレンタム[®]クリーム

非ステロイド性鎮痒消炎薬



- 非ステロイド性抗炎症成分ウフェナマートに、かゆみを抑えるリドカイン、マレイン酸クロルフェニラミン、皮膚の血行を改善する酢酸トコフェロールを配合した鎮痒消炎薬で、皮膚炎、かゆみ、湿疹などにすぐれた効果を発揮します。
- べとつかず、のびがよく、塗った後も目立たない使いやすいクリームです。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4)患部が広範囲の人。
 - (5)湿潤やただれのひどい人。又は化膿している人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください
 - (1)使用後、次の症状があらわれた場合



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、刺激感(ヒリヒリ感)、熱感、乾燥感

- (2)5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合、また症状の悪化がみられた場合

〔効 能〕

皮膚炎、かゆみ、湿疹、かぶれ、おむつかぶれ、ただれ、あせも

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布します。

チューブ穴のあけ方

キャップを逆にして、チューブの口元に強く押し当ててください。



〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 患部を清潔にしてから、使用してください。

【成分・分量と働き】 1g中

成 分	分 量	働 き
ウフェナマート	50mg	皮膚刺激作用の弱い非ステロイド性抗炎症成分で、炎症部位に直接作用し、炎症の原因物質の生成を抑え、患部の炎症や痛みを抑えます。
リドカイン	10mg	局所麻酔作用により、皮膚炎、かぶれなどに伴う不快なかゆみや痛みを抑えます。
マレイン酸 クロルフェニラミン	10mg	抗ヒスタミン作用により、患部の炎症を緩和し、かゆみを抑えます。
酢酸トコフェロール (ビタミンE酢酸エステル)	5mg	皮膚の血行を改善することにより、皮膚の新陳代謝をよくします。

添加物として、ワセリン、流動パラフィン、グリセリン、ステアリルアルコール、ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸マクロゴール、パラベンを含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限(外箱及びチューブに記載)をすぎた製品は、使用しないでください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は
下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間:9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号