第2類医薬品

開け口

24錠 8日分

販売名ラックル

解熱鎮痛薬

服用に際して、この箱の説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

腰痛・神経痛に早く効く

ラックル® すぐに溶け出す 速溶錠

胃にやさしい
眠くならない

特　長

- 水に触れるとすぐに溶け出す速溶錠です。
- 腰痛・神経痛に早く効く飲み薬です。
- 胃にやさしく、眠くなりません。
- カリカリとかみくだくか、軽く口の中で溶かしてから、水と一緒に服用。
- すっきりとしたミント味です。
- 外出時に携帯しやすいシート包装です。
- 防腐剤無添加・塩分無配合。

用法・用量

成人（15歳以上）、**1回1錠、1日3回**を限度とし、なるべく空腹時をさけて、かみくだくか、軽く口中で溶かした後、水と一緒に服用して下さい。服用間隔は4時間以上おいて下さい。15歳未満は服用しないで下さい。

用法・用量に関連する注意

(1) 定められた用法・用量を厳守して下さい。(2) 図のようにシート包装の凸部を指先で押して錠剤を取り出し、服用して下さい。誤ってシート包装のまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながりますのでご注意下さい。

効能・効果

- 腰痛・神経痛・関節痛・肩こり痛・筋肉痛・頭痛・ねんざ痛・外傷痛・打撲痛・骨折痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・月経痛（生理痛）の鎮痛
- 悪寒・発熱時の解熱

販売
日本臓器製薬株式会社
大阪市中央区平野町2-1-2
お客様相談窓口 ☎06・6222・0441
土・日・祝日を除く 9:00～17:00

製造販売元
東亜薬品株式会社
富山県富山市水橋開発277番10

副作用被害救済制度 ☎0120・149・931

第2類医薬品 ラックル®

成分 1錠中 アセトアミノフェン300mg
添加物 トウモロコシデンプン、セルロース、l-メントール、エリスリトール、ステアリン酸マグネシウム、無水ケイ酸、アクリル酸エチル・メタクリル酸メチル共重合体、ヒドロキシプロピルセルロース、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、アセスルファムカリウム、赤色3号

保管及び取扱い上の注意
(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管して下さい。(2) 小児の手の届かないところに保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）。(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

4 987174 717018

® 登録商標

03

▲ 服用上の注意 **次のことをしてはいけないこと**（守らないと現在の症状が悪化したり副作用・事故が起こりやすくなります）
1. 次の人は服用しないで下さい。(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用している人。2. 本剤を服用しているあいだは、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬。3. 服用前後は飲酒しないで下さい。4. 長期連用しないで下さい。

第2類医薬品

24錠 8日分

腰痛・神経痛に早く効く

ラックル® すぐに溶け出す 速溶錠

胃にやさしい　眠くならない

第2類医薬品

腰痛
神経痛に
早く効く

ラックル® すぐに溶け出す 速溶錠

胃にやさしい
眠くならない

24錠 8日分

腰痛・神経痛に早く効く
ラックル® すぐに溶け出す 速溶錠
胃にやさしい
眠くならない

使用期限　製造番号

24錠 8日分
第2類医薬品

▲ 使用上の注意 **相談すること**
1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談下さい。(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 高齢者。(4) 薬によってアレルギー症状を起こしたことがある人。心臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談下さい。

部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	過度の発汗、血圧低下

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
ショック（アナフィラキシー）	服用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の異常があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、口内・唇・陰部・手足などのただれ、のどの痛み、全身の広範囲の発疹・発赤、水ぶくれ、皮ふ表面がはがれるなどの症状があらわれる。
肝機能障害、黄疸	発熱、かゆみ、発疹、倦怠（けだるい感じ）、食欲不振、全身のだるさ、全身がだるく、疲れやすい、こしの痛み、尿の出が悪くなる。
間質性肺炎	階段を上ったり、軽くかけあしをしただけで息切れがする、息苦しくなる、乾燥したせき、発熱、全身のだるさ、関節痛（ふしの痛み）、筋肉痛などがあらわれる。
腎障害	発熱、発疹、全身のだるさ、関節痛（ふしの痛み）、下痢などがあらわれる。
ぜんそく	息をするとき、ゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい感じがあらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。