

第2類医薬品

開け口

24錠 8日分
販売名ラックル

解熱鎮痛薬

腰痛・神経痛に早く効く
ラックル すぐに溶け出す 胃にやさしい
速溶錠 眠くならない

特長

- 水に触れるとすぐに溶け出す速溶錠です。
- 腰痛・神経痛に早く効く飲み薬です。
- 胃にやさしく、眠くなりません。
- カリカリとかみくだか、軽く口の中で溶かしてから、水と一緒に服用。
- すっきりとしたミント味です。
- 外出時に携帯しやすいシート包装です。
- 防腐剤無添加・塩分無配合。

用法・用量

成人（15歳以上）、1回1錠、1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさせて、かみくだか、軽く口の中で溶かした後、水と一緒に服用して下さい。服用間隔は4時間以上おいて下さい。15歳未満は服用しないで下さい。

用法・用量に関連する注意

(1) 定められた用法・用量を厳守して下さい。(2) 図のようにシート包装の凸部を指先で押し錠剤を取り出し、服用して下さい。誤ってシート包装のまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながりますのでご注意ください。

効能・効果

- 腰痛・神経痛・関節痛・肩こり痛・筋肉痛・頭痛・ねんざ痛・外傷痛・打撲痛・骨折痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・月経痛（生理痛）の鎮痛
- 悪寒・発熱時の解熱

販売

日本臓器製薬株式会社
大阪市中央区平野町2-1-2
お客様相談窓口 ☎06-6222-0441
土・日・祝日を除く9:00~17:00

製造販売元

東亜薬品株式会社
富山県富山市水橋開発277番10
副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

服用に際してこの箱の説明書を必ずお読み下さい。また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品
ラックル®
▲**使用上の注意** 必ずお読みください。守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・重篤な副作用（重篤な副作用）が起きることがあります。1. 次の人は服用しないで下さい。(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー反応を起こしたことのある人。(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起したことのある人。(3) フェニチン投与中の人（本剤はフェニチンと相互作用を有するため）。2. 本剤を服用して嘔吐、下痢、次のいずれかの医師による服用中止を要する場合は、次のいずれかの医師に服用中止を要する旨を伝え、必要に応じて他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮痛薬、3. 服用前後は飲酒しないで下さい。4. 長期服用しないで下さい。

成分 1錠中 アセトアミノフェン300mg
添付物 トロキサロラン、セルロース、マンニトール、エリスリトール、ステアリン酸マグネシウム、無水ケイ酸、フェニルエチルアルコール、メタクリル酸メチル、メタクリル酸ブチル、トロンキシル、ステアリン酸、フェニルエチルアルコール、赤色3号

包装及び取扱い上の注意
(1) 直射日光の当たらない涼しいところで保管して下さい。(2) 小児の手の届かないところに保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(4) 使用期限を過ぎたものは服用しないで下さい。



第2類医薬品


24錠 8日分

腰痛・神経痛に早く効く

ラックル すぐに溶け出す
速溶錠

胃にやさしい 眠くならない

第2類医薬品



腰痛
神経痛に
早く効く

ラックル すぐに溶け出す
速溶錠

胃にやさしい
眠くならない



24錠 8日分

腰痛・神経痛に早く効く

ラックル すぐに溶け出す
速溶錠

使用期限 製造番号

24錠 8日分

第2類医薬品

まれに下記に示す重篤な症状が起ることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けて下さい。

部位	症状
皮膚	発疹、発熱、かゆみ
消化器	吐き気、嘔吐、食欲不振
神経系	めまい
その他	過敏性腸症候群、体温低下

① 1週間以上服用し、下記のいずれかの症状があらわれる人は、直ちに医師の診察を受けて下さい。(1) 医師又は薬剤師からの指導を受けている人。(2) 好動又は好眠傾向の増強があらわれる人。(3) 高熱等。(4) 薬などによりアレルギー反応を起したことがある人。(5) 次の診断を受けた人。心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍、糖尿病、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この薬を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。