

第2類
医薬品

4 987174 717117



腰痛
神経痛に
早く効く

ラックル® すぐに溶け出す
速溶錠

胃にやさしい
眠くならない

12錠 4日分

第2類
医薬品

添加物 トウモロコシデンプン、セルロース、*l*-メントール、エリスリトール、ステアリン酸マグネシウム、無水ケイ酸、アクリル酸エチル・メタクリル酸メチル共重合体、ヒドロキシプロピルセルロース、アスパルテーム (*l*-フェニルアラニン化合物)、アセスルファムカリウム、赤色3号

製造番号

⚠ 使用上の注意

■ 相談すること

1. 次の医師用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録医事考査に合格した人。(1)医師又は歯科医師の診療を受けたい人。(2)好都合に相談したいと思われる人。(3)高熱時。(4)薬などによりアレルギー症状を起したことがある人。(5)次の診察を受けた人、心臓病、腎臓病、肝臓病、腎・十二指腸病等。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この項を持って医師、薬剤師又は登録医事考査者に相談下さい。

(右側面へ)

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、 食欲不振
精神 神経系	めまい
その他	過度の体温低下

(左側面より続く) まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

[illegible]

開け口 **12錠 4日分**

服用に際して、この箱の説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

腰痛・神経痛に **ラックル** **速溶錠** すぐに溶け出す 胃にやさしい
早く効く 眠くならない

特長

- 水に触れるとすぐに溶け出す速溶錠です。
- 腰痛・神経痛に早く効く飲み薬です。
- 胃にやさしく、眠くなりません。
- カリカリとかみくだくか、軽く口の中で溶かし
てから、水と一緒に服用。
- すっきりとしたミント味です。
- 外出時に携帯しやすいシート包装です。
- 防腐剤無添加・塩分無配合。

用法・用量
成人（15歳以上）、1回1錠、1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさせて、かみくだくか、軽く口中で溶かした後水と一緒に服用して下さい。服用間隔は4時間以上おいて下さい。15歳未満は服用しないで下さい。

用法・用量に関連する注意
(1) 定められた用法・用量を厳守して下さい。(2) 図のようにシート包装の凸部を指先で押し、鋭角を取り出し、服用して下さい。誤ってシート包装のまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながりますのでご注意下さい。

効能・効果
●腰痛・神経痛・関節痛・肩こり痛・筋肉痛・頭痛・ねんざ痛・
外傷痛・打撲痛・骨折痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳
痛・月経痛（生理痛）の鎮痛

●悪寒・発熱時の解熱

成分 1錠中 アセトアミノフェン300mg

⚠ 使用上の注意 **⊗ してはいけないこと**

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）
 1. 次の人は服用しないで下さい。1.本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。2.本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。3.フェニルケトン尿症の人（本剤にはフェニルアラニン化合物を含有する）。2.本剤を服用している間は、次のいずれの薬品も服用しないで下さい。他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬。3.服用前後は飲酒しないで下さい。4.長期連用しないで下さい。

保管及び取扱い上の注意
 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管して下さい。
 (2) 小児の手の届かないところに保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

紙

製造販売元

日本臓器製薬株式会社 お問い合わせ先 ☎06-6222-0441

大阪市中央区平野町4丁目2番3号 土・日・祝日を除く 9:00~17:00

副作用被害救済制度 20120・149・931

紙

® 登錄商標 05