

ワクチンによる
注射後の痛み
頭痛・発熱に

アセトアミノフェンのみ配合
すぐに溶け出す
ラックル® 速溶錠

副反応が出る前に飲まないで下さい

第2類医薬品

解熱鎮痛薬

特長

- アセトアミノフェンのみ配合したワクチンによる注射後の痛み・頭痛・発熱に効く飲み薬です。
- 水に触れるとすぐに溶け出す速溶錠です。早く効きます。
- 胃にやさしく、眠くならない。
- 携帯しやすいシート包装です。
- すっきりとしたミント味。
- 防腐剤無添加・塩分無配合。
- 痛みや発熱が続く場合、4時間以上あければ1日3回まで飲めます。



効能・効果

- 外傷痛・頭痛・筋肉痛・関節痛・咽喉痛・神経痛・打撲痛・腰痛・肩こり痛・ねんざ痛・歯痛・抜歯後の疼痛・骨折痛・耳痛・月経痛(生理痛)の鎮痛
- 発熱時・悪寒時の解熱

用法・用量

副反応が出る前に飲むとワクチンの予防効果が減少することがあります。副反応が出た後に飲んで下さい。

成人(15歳以上)、1回1錠、1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさせて、かみくだくか、軽く口中で溶かした後、水と一緒に服用して下さい。服用間隔は4時間以上あけて下さい。15歳未満は服用しないで下さい。

成分 1錠中 アセトアミノフェン300mg

添加物 トウモロコシデンプン、セルロース、メントール、エリスリトール、ステアリン酸マグネシウム、無水ケイ酸、アクリル酸エチル・メタクリル酸メチル共重合体、ヒドロキシプロピルセルロース、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、アセスルファムカリウム、赤色3号

用法・用量に関連する注意

(1) 定められた用法・用量を厳守して下さい。(2) 図のようにシート包装の凸部を指先で押して錠剤を取り出し、服用して下さい。誤ってシート包装のまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながりますのでご注意下さい。



⚠ 使用上の注意 ⚠ してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。

1. 次の人は服用しないで下さい。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3) フェニルケトン尿症の人（本剤はL-フェニルアラニン化合物を含有するため）。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬。
3. 服用前後は飲酒しないで下さい。
4. 長期連用しないで下さい。

⚠ 使用上の注意 ⚠ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の診断を受けた人。心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振	その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、 中毒性表皮壊死融解症、急性 汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のたれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の 発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全 身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身 のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎 障 害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛 （節々が痛む）、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、 空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、
薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管して下さい。(2) 小児の手の届かないところに保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）。(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。


すぐに溶け出す
速溶錠



第2類
医薬品

使用期限

體面聯名



腰痛
神経痛に
早く効く

ラックル すぐに溶け出す
速溶錠

胃にやさしい
眠くならない

12錠 4日分

すぐに溶け出す
速溶錠

12錠
4日分

第2類
医薬品

添加物 トウモロコシデンプン、セルロース、*l*-メントール、エリスリトール、ステアリン酸マグネシウム、無水ケイ酸、アクリル酸エチル・メタクリル酸メチル共重合体、ヒドロキシプロピルセルロース、アスパルテム（*L*-フェニルアラニン化合物）、アセスルファムカリウム、赤色3号

症 状	生後4日の名称
乳熱、乳瀉、腹瀉の減少、全身のむくみ、全身のたるみ、胸悶痛（胸が煩悶）、下痢等があらわれる。	乳 瀉 書
腹股を上がり、少く無痛に足りたると無痛に足りたると、母乳しなくなる、空乳、乳熱等がみられ、これらが急にあらわれ、特異になりす。	乳 瀉 書
母乳をするときは、ヒューヒューと聞こえ、母乳しなくなる。	乳 瀉 書

5～6回服用しても症状がよくなる場合、この箱を
持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。

症 状

服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどの熱、目の充血、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

このほか、目やに、舌のだだれ、のどの痛み、皮膚の広範囲熱、目の充血、発熱、背に悪臭のするフツツ小膿疱の発生、痒疹、発汗、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、激激に悪化する。

発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

シヨック(アナフィラキシー)
皮膚粘膜眼症候群(ステイ
—ブンス・ジョンソン症候
群)、中毒性表皮壊死剥離症、
急性汎発性発疹性膿疱症

中國圖書分類法

開け口
12錠 4日分

販売名ラックル
解熱鎮痛薬

服用に際して、この箱の説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

腰痛・神経痛に **ラックル** **速溶錠** **早く効く** **すぐに溶け出す** **胃にやさしい** **眠くならない**

特 長

- 水に触れるとすぐに溶け出す速溶錠です。
- 腰痛・神経痛に早く効く飲み薬です。
- 胃にやさしく、眠くなりません。
- カリカリとかみくだくか、軽く口の中で溶かしてから、水と一緒に服用。
- すっきりとしたミント味です。
- 外出時に携帯しやすいシート包装です。
- 防腐剤無添加・塩分無配合。

用法·用量

成人（15歳以上）、1回1錠、1日3回を限度とし、なるべく空腹時にさけて、かみくだか、軽く口中で溶かした後、水と一緒に服用して下さい。服用間隔は4時間以上おいて下さい。15歳未満は服用しないで下さい。

用法・用量に関連する注意

(1) 定められた用法・用量を厳守して下さい。(2) 図のようにシート包装の凸部を指先で押して錠剤を取り出し、服用して下さい。誤ってシート包装のまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながりますのでご注意ください。

效能・効果

●腰痛・神経痛・関節痛・肩こり痛・筋肉痛・頭痛・ねんざ痛・
外傷痛・打撲痛・骨折痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳
痛・月経痛（生理痛）の鎮痛

●悪寒・発熱時の解熱

成分 1錠中 アセトアミノフェン300mg

⚠ 使用上の注意 **⊗ してはいけないこと**

(守らないと病状の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないで下さい。(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことのある人。(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことのある人。(3) フェニルalanin 症候の人(本剤はフェニルalanin 化合物含有するため)。2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬。3. 服用前後は飲酒しないで下さい。4. 長期連用しないで下さい。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管して下さい。
(2) 小児の手の届かないところに保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

® 登錄商標 05

日本臓器製薬株式会社 お問い合わせ先 ☎06-6222-0441

土・日・祝日を除く 9:00~17:00

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

1. 本人又は同居の親戚・血縁者など、相談医師、差別師又は看護師本人者に相談下さい。
 2. 本人又は同居の親戚・血縁者又は差別師の診察を受けている。(2)好まぬ又は好まないという思われる。(3)差別師の(4)要なところによりアル。(5)好まぬを記したことがある人。(5)次の診察を受けた人。心臓病、腎臓病、肝臓病、腎臓、十二指腸病など。

2. 服用できる、症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この書を持って医師、差別師又は看護師本人者に相談して下さい。(右側面)

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、 食欲不振
神 経 神経系	めまい
その他	過度の体温低下

左側面より焼く） まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

 紙