

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

第2類医薬品

化膿性皮膚疾患用薬

エピロンエー[®]

製品の特徴

エピロンエーは、

- 化膿の原因となる細菌(ブドウ球菌、レンサ球菌)に抗菌性を示し、二次感染を防ぐホモスルファミンを主成分とし、さらに治療効果を高める尿素、ビタミンA油、酸化亜鉛、アラントイン、トコフェロール酢酸エステルを配合した皮膚の化膿止め軟膏です。
- 刺激が少ない油性基剤を用いた軟膏です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 患部が広範囲の人
 - (4) 湿潤やただれのひどい人
 - (5) 深い傷やひどいやけどの人
 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
3. 5～6日間使用しても症状がよならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

化膿性皮膚疾患、とびひ、面ちょう

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布するか、ガーゼなどにのびして貼付してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。

成分とはたらき

成分	分量 (100g中)	はたらき
ビタミンA油 (1g中に100万ビタミンA単位含有)	0.2g	上皮組織の新陳代謝を促進します。
ホモスルファミン	2.0g	化膿の原因となる細菌(ブドウ球菌、レンサ球菌)を殺菌します。
尿素	5.0g	ホモスルファミンの殺菌作用を高めます。
酸化亜鉛	30.0g	患部を保護し、治りを助けます。
アラントイン	0.5g	肉芽形成を促進し、患部の治りを早めます。
トコフェロール酢酸エステル	0.1g	血行を促進し、患部の治りを早めます。

添加物として、BHT、没食子酸プロピル、タルク、香料、プロピレングリコール、ミリスチン酸イソプロピル、ラノリン、流動パラフィン、サラシミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、ワセリンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5) 寒冷時に軟膏が硬くなることがあります。その場合は、暖かい所にしばらく置いて軟らかくなってから使用してください。

●ワンポイント情報

皮膚病には種々の原因がありますが、その治療には皮膚を清潔にし、適切な薬物を選択するというような初期の対処が大切です。皮膚を不潔にしたり患部を放っておくと、気づかぬうちに細菌の生育に適した環境となって膿(うみ)をもつようになり、場合によってはさらに広がり、治り難くなることがあります。日頃から皮膚を清潔にし、早めの治療を心がけましょう。



お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 お客様相談室

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目5-1

☎ 03-3293-3363

受付時間 9時～12時、13時～17時(土、日、祝日を除く)



ワクナガ

製造販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624

本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36

http://www.wakunaga.co.jp/