

ご使用に際し、この添付文書は必ずお読みください。
また、必要なときにすぐ読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

目のかすみ・まぶたのただれ・疲れ目に ベロリチンEX点眼薬

生薬由来成分配合

【特徴】

- 「ベロリチンEX点眼薬」には、古来から漢方処方で抗炎症の目的で用いられてきたベルベリンとグリチルリチン酸の二つの生薬由来成分が含まれています。
- その他、目のかゆみを緩和するクロルフェニラミンマレイン酸塩、炎症を鎮めるイプシロン-αアミノカプロン酸、充血を緩和する塩酸テトラヒドロゾリン、角膜保護成分のコンドロイチン硫酸エステルナトリウム、目の疲れを改善するタウリン、ピリドキシン塩酸塩、パンテノールなど、9つの有効成分の働きで、様々な目の症状を緩和します。
- ほどよい清涼感の黄色の点眼薬です。

△【使用上の注意】



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 次の症状のある人：はげしい目の痛み
(4) 次の診断を受けた人：緑内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は、使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
(1) 目のかすみが改善されない場合。
(2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合。

【効能・効果】

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

【用法・用量】

1回1～3滴、1日3～6回点眼してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血をまねくことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先が、まぶたやまつ毛などに触れると、目やにや雑菌などのため、薬液が汚染または混濁することがありますので注意してください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 本剤は、点眼用にのみ使用してください。

（裏面へ続く）

【成分・分量（100mL中）】

有効成分	含有量	はたらき
ベルベリン硫酸塩水和物	10mg	炎症による目のかゆみ、充血などの症状を改善します。
グリチルリチン酸二カリウム	250mg	
イブシロン-アミノカブロン酸	1,500mg	炎症の原因物質を抑制することにより、目の炎症を鎮めます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg	抗ヒスタミン作用により、目のかゆみを鎮めます。
塩酸テトラヒドロゾリン	50mg	血管収縮作用により、目の充血を緩和します。
ピリドキシン塩酸塩	50mg	目の細胞の新陳代謝を促進し、疲れ目を改善します。
パンテノール	100mg	
タウリン	1,000mg	目に栄養を与え、炎症によって傷ついた目の組織修復を助けます。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	250mg	角膜を保護し、目にうるおいを与えるとともに、眼組織のはたらきを活性化させ、目の疲れを改善します。

添加物として、エデト酸ナトリウム水和物、ホウ酸、d-ボルネオール、l-メントール、塩化ナトリウム、クロロブタノール、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸メチルを含有しています。

＜成分・分量に関連する注意＞

本剤は点眼後、ときに口中に甘味を感じることがあります。これは成分のひとつであるグリチルリチン酸二カリウムが涙道を通して口中に流れ出てくることによるもので、品質などの異常によるものではありません。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります）。
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限（外箱に表示）を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかに使用してください。
- (6) 本点眼薬の黄色は生薬由来成分「ベルベリン硫酸塩水和物」の色です。点眼の際、衣服などに付けないよう、十分ご注意ください。
- (7) 保存の状態によっては、容器の点眼口周囲やキャップの内側に成分の結晶が付くことがあります。このような場合には清潔なガーゼなどで軽くふき取って使用してください。

環境問題に配慮し、携帯袋は採用しておりません。ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室

電話 03-3370-7174 (代表)

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土、日、祝日を除く)

発売元 日邦薬品工業株式会社 東京都渋谷区代々木3丁目46番16号

企画開発元 アスゲン製薬株式会社 名古屋市東区泉二丁目28-8

製造販売元 佐賀製薬株式会社 佐賀県三養基郡基山町小倉481