

## 外用鎮痛消炎薬

# ミツテンFBDローション

### 特 徴

- 痛みや腫れのもとに直接作用するフェルピナクを3.0%配合した非ステロイド系の鎮痛消炎薬です。
- フェルピナクは、患部で痛みや腫れに関係する物質(プロスタグランジン)の生成を抑え、肩・腰・関節・筋肉の痛みにすぐれた効き目をあらわします。
- 背中、腰などの手の届きにくいところにも塗りやすい容器で、痛みの強い部位にもやさしく塗れます。
- *l*-メントール6.0%配合により、塗布後心地よい清涼感があります。

### ⚠ 使用上の注意

#### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

#### 1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (4) 15歳未満の小児。

#### 2. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

#### 3. 長期連用しないでください。

#### 👤 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

#### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれなど

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

#### 3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 効 能 ・ 効 果


肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、関節痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

## 用法・用量

1日2～4回、適量を患部に塗布してください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 15歳未満の小児に使用させないでください。
- (2) 定められた用法を守ってください。
- (3) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 薬剤塗布後、患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。
- (6) 皮膚の弱い人は、同じところに続けて塗布しないでください。
- (7) 入浴前後にご使用になった場合、強い刺激(ヒリヒリする等)を感じる場合があります。この場合はすぐに石けん又はぬるま湯で洗い流してください。
- (8) **スポンジに薬液を十分しみこませてから患部に塗布してください。**薬液をスポンジ面ににじませないで使用すると、スポンジが破損する場合があります。



## 成分・分量

100mL中

成分	分量	働き
フェルピナク	3.0g	炎症を抑え痛みをやわらげます
トメントール	6.0g	清涼感を与え、痛みをやわらげます
クロルフェニラミンマレイン酸塩	100mg	抗ヒスタミン作用により、炎症を抑えます

添加物としてプロピレングリコール、ジブチルヒドロキシトルエン、トリエタノールアミン、エタノールを含有する

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光を避け、キャップをしっかりとめて涼しい所に立てて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 本剤を火気に近づけないでください。
- (5) 揮発性がありますので、使用後はキャップをしっかりとめてください。
- (6) メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具等の塗装面などに付着すると変質又は変色する場合がありますので、付着しないように注意してください。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく早く使用してください。

【内容量】 50mL

火気厳禁

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までご連絡ください。  
〒634-0815 奈良県橿原市大谷町182番地  
(株)雪の元本店 お客様相談室  
受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00(土曜、日曜、祝日を除く)  
TEL.0744-22-2440 FAX.0744-22-2406

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
☎ 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元  
株式会社 雪の元本店  
奈良県橿原市大谷町182番地