



服用に際して、この添付文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

イ ス ク ラ そ う りょう さん じょう がん

イスクラ双料参茸丸

(生薬製剤)

■特徴

「イスクラ双料参茸丸」には鹿茸や人参など動物・植物計14種類の生薬が配合されており、これらの原料を粉末にし丸剤とし、プラスチック製の容器に入れ密封したものです。虚弱体質、肉体疲労、病後の体力低下、胃腸虚弱、食欲不振、血色不良、冷え症の改善を目的としております。

⚠ 使用上の注意



■ 相談すること

1. 次の人は、服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 体を冷やす冷たい飲み物、生もの(生野菜、生魚等)は薬効を妨げますので、なるべくさけて下さい。

4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。
下痢

■効能・効果

次の場合の滋養強壮

虚弱体質、肉体疲労、病後の体力低下、胃腸虚弱、食欲不振、血色不良、冷え症

■用法・用量

次の量を、1日2回、朝夕服用して下さい。


年齢	1回の服用量	1日の服用回数
成人(15歳以上)	1丸	2回
15歳未満	服用しないで下さい。	

●服用に際しての注意

- (1) 服用の際、密封したプラスチック製の容器を割り、包みを除き、丸剤を取り出して、分割し服用して下さい。
- (2) 定められた用法・用量を厳守して下さい。
- (3) 本剤は15歳未満の小児に服用させないで下さい。



(裏面につづく)

●服用法




1. 中央の分割線を、親指と人さし指で押さえ、外装の白蠟とプラスチック製の容器を割る。
※品名印章を真上にした場合、水平方向が分割線となります。

2. 蠟封したプラスチック製の容器から丸剤を取り出す。



3. 丸剤を包んでいるセロファンをはがす。

4. 丸剤を、分割して服用する。



◎ 蠟封した容器が割れにくい場合は、机など清潔な硬い平らな場所に、分割線が垂直になるように置き、手のひらで押し付けると割れます。

■成分・分量

本品1日量2丸(20.4g)中、下記成分及び分量を含有します。

オウギ……………1.13g	カンゾウ……………0.11g
ニンジン……………1.13g	トウジン……………1.13g
ブクリョウ……………1.13g	ロクジョウ……………1.13g
クコシ……………0.68g	カラトウキ……………0.94g
ジオウ……………0.56g	ハゲキテン……………0.56g
サンヤク……………0.23g	ゴウカイ……………0.34g
ビャクジュツ……………0.23g	トウチュウカソウ……………0.34g

※添加物としてハチミツ、ゴマ油、ミツロウを含有します。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管して下さい。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないで下さい。
- (4) この文書は、本剤を服用の際に必要な注意事項等が記載されていますので、箱に入れて保管して下さい。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

◎お問合せ先

イスクラ産業株式会社 お客様相談室
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-14-2
電 話：03-3281-3363
受付時間：午前9:00から午後5:00まで
(土、日、祝日を除く)

製造販売元

イスクラ産業株式会社

東京都中央区日本橋1-14-2