

■ YAMAMOTO KANPOH

日本薬局方 **ウワウルシ**

第2類医薬品

(販売名) ウワウルシ ヤマモト

〈成分及び分量〉 1日量(10g)中 日本薬局方 ウワウルシ 10g

〈用法及び用量〉 大人(15才以上)は、1日量10gを、水約600mlをもって煮て、約400mlに煮つめ、滓をこして取り去り、食前又は食間3回に分服する。

〈注意〉 定められた用法及び用量を厳守してください。

〈効能又は効果〉 残尿感、排尿に際し不快感のあるもの

〈使用上の注意〉

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人。

2. 次の場合は服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

1ヶ月位服用しても症状の改善がみられない場合

〈保管及び取扱い上の注意〉

(1) 小児の手のとどかない所に保管してください。

(2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。

(4) 使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度 0120-149-931

商 品 名 **ウワウルシ**

内 容 量 **250 g**

L O T **20070141**

保存方法 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しいところに保管して下さい。

製 造
販売元

① 山本漢方製薬株式会社
愛知県小牧市多気東町156番地

■ YAMAMOTO KANPOH

日本薬局方 **ウワウルシ**

第2類医薬品

(販売名) ウワウルシ ヤマト

〈成分及び分量〉 1日量(10g)中 日本薬局方 ウワウルシ 10g

〈用法及び用量〉 大人(15才以上)は、1日量10gを、水約600mlをもって煮て、約400mlに煮つめ、滓をこして取り去り、食前又は食間3回に分服する。

〈注意〉 定められた用法及び用量を厳守してください。

〈効能又は効果〉 残尿感、排尿に際し不快感のあるもの

〈使用上の注意〉

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人。

2. 次の場合は服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

1ヶ月位服用しても症状の改善がみられない場合

〈保管及び取扱い上の注意〉

(1) 小児の手のとどかない所に保管してください。

(2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。

(4) 使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度 0120-149-931

商 品 名 **ウワウルシ**

内 容 量 **500 g**

L O T **00701241**

保存方法 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しいところに保管して下さい。

製 造
販売元

① 山本漢方製薬株式会社
愛知県小牧市多気東町156番地