

この説明書は、服用前に必ずお読み下さい。
また、必要時に読めるよう保管しておいて下さい。

血清高コレステロール改善薬

第3類医薬品

エパシオン

エパシオンは、コレステロールの代謝を促し吸収を阻害して、体の内側から気になるコレステロールを改善する医薬品です。

パンテチンが血液中のコレステロールの代謝を促進し、大豆油不けん化物(ソイステロール)がコレステロールの吸収を抑え、ビタミンEが過酸化脂質(血管のサビ)を抑え血流をよくします。これらの作用により、高コレステロールを改善します。また、高コレステロールに伴う手足の冷え、しびれを緩和します。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
医師の治療を受けている人
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心、胃部不快感、胸やけ、食欲不振、腹痛、吐き気

- (2) 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合（1ヶ月ほど服用後、医療機関でコレステロール値の測定をすること）
- 生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがある。
出血が長く続く場合は、医師又は薬剤師に相談して下さい。
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。
下痢、軟便

★裏面につづく

【効能・効果】

血清高コレステロールの改善

血清高コレステロールに伴う末梢血行障害（手足の冷え・しびれ）の緩和

【用法・用量】

次の量を食後に服用して下さい。水又はぬるま湯と一緒に服用して下さい。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	2カプセル	3回
15歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 用法・用量を厳守して下さい。
2. 血清高コレステロールの改善には食事療法が大切なので、本剤を服用しても食事療法を行って下さい。

【成分・分量】

6カプセル(成人の1日服用量)中

有効成分	日本薬局方パンテチン	375mg
	大豆油不けん化物（ソイステロール）	600mg
	酢酸d- α -トコフェロール	100mg
添 加 物	ポリソルベート80、グリセリン脂肪酸エステル、サフラワー油、ゼラチン、コハク化ゼラチン、濃グリセリン、酸化チタン、黄色三二酸化鉄	

【保管及び取扱い上の注意】


- (1) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かないところに保管して下さい。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために他の容器に入れ替えないで下さい。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

本製品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

原沢製薬工業株式会社 開発本部 お客様相談室

電話：(03) 3441-5191（代表）

受付時間：9:30～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売  ハラザキ

原沢製薬工業株式会社

東京都港区高輪3丁目19番17号