

この説明書は、服用前に必ずお読み下さい。
また、必要時に読めるよう保管しておいて下さい。

血清高コレステロール改善薬

第3類医薬品

エパシオン

エパシオンは、コレステロールの代謝を促し吸収を阻害して、体の内側から気になるコレステロールを改善する医薬品です。

パンテチンが血液中のコレステロールの代謝を促進し、大豆油不けん化物(ソイステロール)がコレステロールの吸収を抑え、ビタミンEが過酸化脂質(血管のサビ)を抑え血流をよくします。これらの作用により、高コレステロールを改善します。また、高コレステロールに伴う手足の冷え、しびれを緩和します。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、胃部不快感、胸やけ、食欲不振、腹痛

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
下痢、軟便、便秘
- 1ヶ月位服用してもコレステロール値の改善が見られない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
(1ヶ月ほど服用後、医療機関でコレステロール値の測定をして下さい)
- 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

【効能・効果】

血清高コレステロールの改善

血清高コレステロールに伴う末梢血行障害（手足の冷え・しびれ）の緩和

【用法・用量】

次の量を食後に服用して下さい。水又はぬるま湯と一緒に服用して下さい。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	2カプセル	3回
15歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 用法・用量を厳守して下さい。
2. 血清高コレステロールの改善には食事療法が大切なので、本剤を服用しても食事療法を行って下さい。

【成分・分量】

6カプセル(成人の1日服用量)中

有効成分	大豆油不けん化物（ソイステロール） 日本薬局方 パンテチン 酢酸d- α -トコフェロール	600mg 375mg 100mg
添加物	ポリソルベート80、グリセリン脂肪酸エステル、サフラワー油、ゼラチン、コハク化ゼラチン、濃グリセリン、酸化チタン、黄色三二酸化鉄	

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かないところに保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

本製品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます

原沢製薬工業株式会社 お客様相談室

電話：(03) 3441-5191

受付時間：9:30～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元  **ハラオカ**

原沢製薬工業株式会社

東京都港区高輪3丁目19番17号