

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第3類医薬品

今ある歯を1本でも多く守る

歯肉炎・歯槽膿漏薬

デントヘルスR

歯ぐきの痛み・腫れ・出血、口内炎に

## 【特長】

デントヘルスRは歯ぐきが腫れるなどつらい時に、指で患部に塗り込む塗布タイプの歯肉炎・歯槽膿漏薬です。

- 4つの有効成分が歯ぐきの痛み・腫れ・出血といった歯肉炎・歯槽膿漏の諸症状を緩和。口内炎にも効きめがあります。
- 有効成分がだ液に流されにくい滞留処方で、患部にしっかりと留まり、すぐれた効果を発揮します。
- 患部に塗りやすく、爽やかな使用感のゲルタイプです。



### 使用上の注意



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
その他の	味覚異常

3. しばらく使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能

歯肉炎・歯槽膿漏における諸症状(歯ぐきの出血・発赤・はれ・うみ・痛み・むずがゆさ、口のねばり、口臭)の緩和、口内炎。

## 用法・用量

歯肉炎・歯槽膿漏:1日2回(朝・晩)ブラッシング後、適量(約0.3g、約1.5cm)を指にのせ、歯ぐきに塗り込んでください。

口 内 炎:1日2~4回、適量を患部に塗ってください。

### 〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 歯科用にのみ使用してください。

必ず裏面もお読みください



## 成分(100g中)

成 分	含 量	はたらき
グリチルリチン酸二カリウム	0.4g	抗炎症作用により、歯ぐきのはれ、発赤を緩和します。
アラントイン	0.3g	組織修復作用により、歯ぐきからの出血をおさえます。
ヒノキチオール	0.1g	組織収斂作用により、歯ぐきをひきしめ、はれを緩和します。
セチルピリジニウム塩化物水和物	0.05g	殺菌作用により、歯周疾患の原因となる細菌の増殖をおさえます。

添加物として、カルボキシビニルポリマー、ヒプロメロース、ポビドン、アルギン酸Na、pH調整剤、グリセリン、エタノール、ポリソルベート60、ステアリン酸ソルビタン、ショ糖脂肪酸エステル、流動パラフィン、香料、L-メントールを含む。

## 保管及び取扱い上の注意


- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)。
- (4)使用期限が過ぎた製品は使用しないでください。

歯槽膿漏は、はっきりとした自覚症状の少ない歯ぐきの病気で、歯を失う原因になります。症状に気づかず、そのままほうっておくと歯ぐきが退縮し、最後には歯が抜けてしまうこともあります。

### <歯肉炎・歯槽膿漏の諸症状>

- 歯ぐきが腫れている ●歯をみがいたときに出血しやすい
- 疲れたときに歯ぐきがうずく(痛む) ●朝、口の中がねばつく ●うみが出て口臭が強い  
こんな症状に気づいたら大切な歯のためにデントヘルスRで早めのお手当を。

### ○歯ぐきの状態と歯槽膿漏の進行(イメージ図)



### ○歯肉炎・歯槽膿漏の予防法

- プラーグ(歯垢)がたまらないように、毎日の丁寧なブラッシングや歯間ブラシ等を使用し歯間のケアをしましょう。
- 歯科医院で定期的に歯石除去、ブラッシング指導などを受けましょう。
- 歯肉炎・歯槽膿漏は、食事や歯みがき、疲労、喫煙などの生活習慣と密接に関わりのある生活習慣病です。生活習慣を見直すことも予防には大切です。

◇歯槽膿漏の予防には[デントヘルス薬用ハミガキSP]をお使いください。

■お問合せ先 お買い求めのお店又は下記にお問合せください

ライオン株式会社 お客様センター

〔0120-813-752〕

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ライオン株式会社

〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7

