

成分及び分量(2本(60mL)中)

ゲンチアナ流エキス…0.6mL、ショウキョウチンキ…0.8mL、蒼朮流エキス…1mL、人參エキス-P…30mg、延胡索乾燥エキス…60mg、カルニチン塩化物…120mg 添加物：白糖、クエン酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エタノール、安息香酸Na、パラベン、トメントール

効能又は効果

食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐

用法及び用量

成人(15歳以上)は1回1瓶(30mL)を1日2回服用する。但し、服用間隔は4時間以上おくこと。

*(1)用法及び用量を厳守して下さい。(2)15歳未満の小児は服用しないで下さい。(3)本剤は生薬成分を配合した内服液ですので、まれに沈澱を生じることがあります。よく振ってから服用して下さい。

お問い合わせ先

発売元：ゼネル薬品工業株式会社
電話番号：06-6352-2381
受付時間：9時から17時まで
(土、日、祝日を除く)

発売元

ゼネル薬品工業株式会社
大阪市北区天満3丁目6番1号
製造販売元
ゼネル薬工粉河株式会社
和歌山県紀の川市粉河840番地

ZENEL

むかつき

胸やけ

胃のもたれ

二日酔

30mL

液

イソロ® digestive

胃腸

ドリンク

S

第2類医薬品

イソロ®胃腸ドリンクS

△使用上の注意



■相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1)医師の治療を受けている人。
- 2.2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

副作用救済制度 電話 0120-149-931

製造番号

使用期限



4