

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
又、必要な時に読めるように大切に保管してください。



リケアA

第2類医薬品

水虫薬 クリーム (水虫・たむし用薬)

水虫・たむしは、白癬菌というカビが皮膚の角質層等に寄生して起こる皮膚病で、かゆみや痛みを伴うことが多くあります。リケアA水虫薬クリームは、有効成分のはたらきにより白癬菌を殺菌し、水虫・たむしによる不快な症状を改善します。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等。
- (2) 湿疹。
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 乳幼児。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が顔面又は広範囲の人。
- (5) 患部が化膿している人。
- (6) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。

(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、
湿疹等他の原因による場合が多い。)



2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、落屑、ただれ、乾燥・つっぱり感、水疱、ヒリヒリ感

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

水虫、いんきんたむし、ぜにたむし

【用法・用量】

1日1～2回、適量を患部に塗布してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5)外用にのみ使用してください。




【成分・分量・はたらき】

成分	100g中	はたらき
ミコナゾール硝酸塩	1.0g	白癬菌を殺菌します。
クロタミトン	10.0g	患部のかゆみをおさえます。
リドカイン	2.0g	患部のかゆみをおさえ、痛みを鎮めます。
グリチルリチン酸二カリウム	0.5g	患部の炎症を改善します。
尿素	3.0g	有効成分の浸透を助けます。

※添加物としてステアリルアルコール、セタノール、トリエタノールアミン、パラベン、プロピレングリコール、ベンジルアルコール、ポリソルベート60、ミリスチン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、ステアリン酸グリセリンを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。（品質保持のため）



水虫治療のポイント

- 患部はいつも清潔にしてください。靴下や靴等も清潔なものを使用してください。
- 白癬菌の寄生は、症状のあらわれている範囲より広がっていることが多いため、薬剤は広めに塗布してください。
- かゆみ等がなくなっても、再発するためしばらくの間は根気よく治療を続けてください。
- 患部のむれを防ぎ、乾燥に心がけてください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願いします。

万協製薬株式会社「お客様相談室」

電話0598-30-5376 受付時間10:00～17:00（ただし、土、日、祝祭日を除きます。）

発売元 **hoyu** ホーユー株式会社
名古屋市東区徳川一丁目501

製造 販売元 **万協製薬株式会社**
三重県多気郡多気町五桂1169-142