

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

[販売名]

外用鎮痛消炎薬

第2類医薬品

近江兄弟社メンタ-ムエプールFE液プラス

■特徴

- エプールFE液プラスは、痛みやはれのもとに直接作用するフェルビナクを3.0%配合した非ステロイド系の鎮痛消炎薬です。
- フェルビナクは、患部で痛みや腫れに関係する物質（プロスタグランジン）の生成を抑え、肩・腰・関節・筋肉の痛みにすぐれた効き目をあらわします。
- 背中、腰などの手の届きにくいところにも塗りやすい容器で、痛みの強い部位にもやさしく塗れます。
- L-メントール6.0%配合により、塗布後心地よい清涼感があります。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3)妊娠又は妊娠していると思われる人。(4)15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください。

- (1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口又は化膿している患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|------------------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ |

*まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|--------------------|---|
| ショック (アナフィラキシー) | 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、打撲、捻挫、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みと腫れ）、肘の痛み（テニス肘など）

【用法・用量】

1日2～4回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1)定められた用法を守ってください。
- (2)目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (3)外用にのみ使用してください。
- (4)薬剤塗布後、患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。

【成分・分量】(100mL中)

| 成分 | 分量 | はたらき |
|-----------------|------|------------------|
| フェルビナク | 3.0g | 炎症を抑え痛みをやわらげます |
| I-メントール | 6.0g | 清涼感を与え、痛みをやわらげます |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 0.1g | 炎症とかゆみをおさえます |

添加物として、プロピレングリコール、ジブチルヒドロキシトルエン、トリエタノールアミン、エタノールを含有する

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直接日光の当たらない湿気の少ない所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤を火気に近づけないでください。また、使用後は火中に投じないでください。
- (5)揮発性がありますので、使用後はキャップをしっかりと締めてください。
- (6)メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、化織の衣類、プラスチック類、床や家具等の塗装面などに付着すると変質又は変色する場合がありますので、付着しないように注意してください。
- (7)使用期限が過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。

〔内容量〕

100mL

*本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

株式会社 近江兄弟社

TEL : 0748-32-3135

受付時間：9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

☎ 0120-149-931 (フリーダイヤル)

発売元 オールジャパンドラッグ株式会社

製造販売元 株式会社 近江兄弟社

滋賀県近江八幡市魚屋町元29