

第2類医薬品

滋養強壯、虚弱体質

販売名:トッカピンAII内服液

(使用上の注意)

【相談すること】

しばらく服用しても症状がよくなり
ない場合は服用を中止し、この
製品を持って医師、薬剤師又は
登録販売者に相談すること

(効能・効果)

●滋養強壯 ●虚弱体質 ●肉体疲
勞・病中病後・食欲不振・栄養障
害・発熱性消耗性疾患・産前産後な
どの場合の栄養補給

(用法・用量)

成人(15歳以上) 1日1回1本
(30mL)を服用する。

・用法及び用量を厳守すること。

ガラス:ピ ン
金属:キャップ

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

使用期限

Lot No.

トッカピン®
AII 内服液

ロクジョウ ニンジン ゴオウ シベット
鹿茸・人參・牛黄・靈猫香



30mL

(成分・分量) 1日量(1本:30mL)中
ニンジンエキス……………55mg
(原生薬として610.5mgに相当)
ゴオウチンキ……………0.2mL
(原生薬として2mgに相当)
ロクジョウチンキ……………0.1mL
(原生薬として30mgに相当)
シベットチンキ……………0.03mL
(原生薬として3mgに相当)
日局タウリン……………300mg
日局チアミン塩化物塩酸塩……………10mg
日局リボフラビン……………2mg
日局ピリドキシン塩酸塩……………6mg
日局ニコチン酸アミド……………20mg
日局無水カフェイン……………50mg
(アルコール含有0.2mL以下)
添加物としてクエン酸、DL-リンゴ酸、白糖、ブドウ糖果糖液糖、D-ソルビトール、カラメル、安息香酸Na、パラベン、アルコール、香料を含有します。

・本剤に配合されているリボフラビンにより、尿が黄色になることがあります。
・生薬成分を含まため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には支障ありません。

(保管及び取扱い上の注意)

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)使用期限が過ぎた製品は服用しないこと。

製造販売元

Kiingo 金陽製薬株式会社
奈良県五條市住川町1420番地
TEL 0747-22-3451