

この添付文書は本剤と共に保管し、
服用に際しては必ずお読みください。

血清高コレステロール改善薬 コレステワン

特 徴

「コレステワン」は血清高コレステロールを改善し、また、血清高コレステロールに伴う末梢血行障害（手足の冷え・しびれ）を緩和する医薬品です。

パンテチンは肝臓におけるコレステロール代謝の促進により、血液中の過剰なコレステロールを減少させ、血管壁への沈着を抑えます。酢酸d- α -トコフェロールは過酸化物質の生成を抑え、大豆油不けん化物は小腸からのコレステロールの吸収を抑えます。

「コレステワン」はこれら3種の成分の働きにより効果を発揮します。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心、胃部不快感、胸やけ、食欲不振、腹痛、はきけ

- (2) 1ヶ月位服用してもコレステロール値の改善がみられない場合
(1ヶ月ほど服用後、医療機関でコレステロール値の測定をすること)
3. 生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、医師又は薬剤師に相談してください
4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
下痢、軟便

効能・効果

血清高コレステロールの改善、血清高コレステロールに伴う末梢血行障害（手足の冷え・しびれ）の緩和

用法・用量

次の量を、食後に水又はぬるま湯で服用してください。

年 齢	1 回服用量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	2 カプセル	3 回
15歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 血清高コレステロールの改善には食事療法が大切なので、本剤を服用しても食事療法を行ってください。

成分・分量

1 日量（6 カプセル）中

成 分	分 量	はたらき
パンテチン (80%パンテチン水溶液)	375mg	肝臓におけるコレステロール代謝の促進により、血液中の過剰なコレステロールを減少させ、血管壁への沈着を抑えます。
大豆油不けん化物	600mg	大豆由来の成分で、小腸からのコレステロールの吸収を妨げ、排泄を促進します。
酢酸d- α -トコフェロール (天然型ビタミンE)	100mg	抗酸化作用により、過酸化脂質の生成を抑制し、末梢血行障害を改善します。

添加物として、ポリソルベート80、サフラワー油、カプセルにゼラチン、濃グリセリン、D-ソルビトール、サンセットイエロー FCF、酸化チタンを含みます。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

〈お問い合わせ先〉
本剤についてのお問い合わせは下記までご連絡ください。
新生薬品工業株式会社
電話番号 0744-52-3330
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **新生薬品工業株式会社**
奈良県高市郡高取町清水谷1269