

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

つらい疲れ目、かすみ目、充血に有効成分12種類が効く

第2類医薬品

# 眼涼<sup>®</sup>12

15mL

眼科用薬

G A N R Y O 一成分一

- 有効成分12種類が、つらい疲れ目、かすみ目、充血などに効果を発揮します。
- ネオスチグミンメチル硫酸塩、3種類のビタミン類、3種類のアミノ酸類をバランスよく配合。ピント調節機能と、目の疲れを改善します。
- 目が疲れてリフレッシュしたいときにも気持ちいい清涼感のあるさし心地です。

## ⚠️ [使用上の注意]



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (3) 次の症状のある人：はげしい目の痛み。
  - (4) 次の診断を受けた人：緑内障。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ
3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - (1) 目のかすみ改善されない場合。
  - (2) 5~6日間使用しても症状がよくなる場合。

**【効能・効果】**目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

**【用法・用量】**1回1~3滴、1日3~6回点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。(目やにや雑菌などのため、薬液が汚染又は混濁することがあります。)また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用のみ使用してください。

## 【成分・分量】

有効成分	含有量 (100mL中)	はたらき
①シアノコバラミン (ビタミンB <sub>12</sub> )	10mg	毛様体筋の働きを活発にし、目の疲れを改善します。
②ネオスチグミンメチル硫酸塩	5mg	ピント調節機能の低下を改善し、目の疲れを改善します。
③ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB <sub>6</sub> )	50mg	角膜細胞の新陳代謝を促進し、目の疲労回復に有効です。
④バンテノール	100mg	活発な新陳代謝に必要な栄養分として働き、目を守ります。
⑤L-アスパラギン酸マグネシウム ・カリウム(等量混合物)	1000mg	アミノ酸の一種で、目の細胞呼吸の活性化とともに栄養を与え、目の疲れを癒します。
⑥タウリン	400mg	目に栄養を与えると同時に代謝改善作用が傷んだ目の組織修復を助けます。
⑦コンドロイチン硫酸エステル ナトリウム	250mg	角膜を保護し、目に潤いを与え、栄養補給を促進します。
⑧クロルフェニラミン マレイン酸塩	30mg	抗ヒスタミン作用により目のかゆみをやわらげます。
⑨塩酸テトラヒドロソリン	50mg	末梢血管収縮作用により、結膜(白目の部分)の充血を取り除きます。
⑩イプシロン-アミノカプロン酸	1000mg	炎症の原因となる物質(プラスミン)の産生を抑え、炎症症状を鎮めます。
⑪グリチルリチン酸二カリウム	250mg	生薬の甘草に由来する成分。炎症による目のかゆみ、まぶたのただれなどの症状を鎮めます。
⑫ベルベリン硫酸塩水和物	10mg	生薬の黄柏・黄連に由来する成分。炎症による目のかゆみ、まぶたのただれなどの症状を鎮めます。

添加物として、エデト酸Na、ℓ-メントール、塩化Na、クロロブタノール、d-ボルネオール、プロピルパラベン、ホウ酸、メチルパラベンを含有します。

### <成分・分量に関連する注意>

本剤は点眼後、ときに口中に甘味を感じることがあります。これは成分であるグリチルリチン酸二カリウムが涙道を通して口中に流れ出てくることによるもので、品質などの異状によるものではありません。

### 保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた商品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかに使用してください。
- (6) 保存状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には、清潔なガーゼで軽くふきとって使用してください。
- (7) 液色は成分の色です。液剤が衣服などに付くと着色することがありますので、付かないように十分注意してください。

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

発売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地

<http://www.hisamitsu.co.jp>

久光製薬お客様相談室：☎0120-133250

受付時間／9:00—17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

製造販売元 **佐賀製薬株式会社** 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町小倉481