

※2012 年 11 月改訂（第2版）
2010 年 9 月作成（初版）

貯 法	室 温 保 存
使用期限	容 器 に 記 載

第2類医薬品

日本標準商品分類番号
872619

承認番号:22200APX00608000
承認年月:2010 年 9 月
販売開始:2010 年 10 月

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

HAKUJUJI ヘキシジン綿球

外用消毒剤〈高圧蒸気滅菌処理済〉

【特徴】

HAKUJUJI ヘキシジン綿球は薬液を吸着しにくい綿球を使用し、外用消毒剤である 0.05w/v%クロルヘキシジングルコン酸塩液を併せて包装し、高圧蒸気滅菌処理をした製品です。

薬液含浸済ですので、開封後そのまま使用できます。

【使用上の注意】

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の人は使用しないこと

本剤又はクロルヘキシジングルコン酸塩（グルコン酸クロルヘキシジン）によるアレルギー症状を引き起こしたことがある人。

次の部位には使用しないこと

- ・膣、膀胱、口腔等の粘膜面
- ・広範囲の患部、深い傷やひどいやけど、ひどいただれ
- ・目のまわり

※ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬や化粧品でアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1)使用後、次の症状が現れた場合

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発 疹 ・ 発 赤 ・ かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
シ ョ ッ ク （アナフィラキシー）	使用後、すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

(2) 5～6 日間使用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】

すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌、消毒

【用法・用量】

本剤を 1 日数回、そのまま患部に塗布して用いる。

（用法・用量に関する注意）

- (1) 外用にのみ使用すること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯でよく洗い、直ちに眼科医の診療を受けること。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (4) 石けん類や血清、膿汁等が付着していると、十分な効果が得られないことがあるので、十分に洗い流してから使用すること。
- (5) 一度個包装を開封したものは、無菌状態が保てないので、開封後は直ちに使い切ること。
- (6) 個包装が開封、破損や他の汚染が見られる場合は使用しないこと。

【成分・分量】

本剤は、下記の成分を含有する。

成 分	溶 液 100mL 中 の 分 量
日局 クロルヘキシジングルコン酸塩液 (20w/v%)	0.25mL (薬液として 0.05w/v%)

薬液の担体として PET 綿球を含む。
PET 綿球 1g に対して薬液 10mL 含浸。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光を避け、湿気の少ないなるべく涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 誤用や品質の低下を避けるため、再使用や他の容器に移し替えをしないこと。
- (4) 使用後は、トイレに流さないで、衛生的に処理すること。
- (5) 綿球、薬液等を継ぎ足して使用しないこと。
- (6) 本品は、小売での開封小分け販売はできない。

【包装】

2 球/1 パック 20 パック入り

※【消費者相談窓口】

白十字株式会社 〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12
お客様相談室 TEL 0120-01-8910（フリーダイヤル）
受付時間 9:00～17:00（月～金 ※祝日を除く）
（休日・夜間 TEL 03-3987-6111）

※【製造販売業者等の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 白十字株式会社
〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

副作用被害救済制度の問合せ先 （独）医薬品医療機器総合機構	電話 ☎ 0120-149-931
----------------------------------	----------------------